

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Supreme 40 EW

FUNGICIDA-TRIAZOL, IMIDAZOL
TEBUCONAZOL, PROCLORAZ

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: N,N - Dimethyl Octanamida

DENSIDAD: 1.05-1.06 g/ml

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: El Tebuconazol y el procloraz son fungicidas sistémicos inhibidores de la síntesis del ergosterol, son de rápida absorción y tienen acción protectante, curativa y erradicante. El tebuconazol se transloca en la planta en dirección acrópeta.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Utilizar una bomba de espalda manual de 18 litros con una boquilla de cono hueco. Volumen de aplicación: 200 - 400 l/ha dependiendo de la etapa fenológica para lograr buena cobertura de todo el follaje

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar botas de hule, respirador, anteojos, guantes, mameluco o delantal largo. No comer, beber o fumar durante dichas tareas, ni destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar contra el viento. Aplicar el producto en días serenos para evitar la deriva sobre cultivos sensibles. Luego de la aplicación es imprescindible lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces. Finalizadas las tareas, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria expuestas al contacto con el producto.



RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA Y PANAMÁ.

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Complejo del manchado del grano <i>Rhizoctonia solani</i> <i>Helminthosporium sp</i> <i>Pyricularia oryzae</i>	1.25-1.5 l/ha
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Mildiu polvoso <i>Erysiphe cichoracearum</i> Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>	0,5 - 0,75 l/ha
Melon <i>Cucumis melo</i>	Mildiu polvoso <i>Erysiphe cichoracearum</i>	0,5 - 0,75 l/ha
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mildiu polvoso <i>Erysiphe cichoracearum</i>	0,5 - 0,75 l/ha
Calabaza <i>Cucurbita sp.</i>	Mildiu polvoso <i>Erysiphe cichoracearum</i>	0,5 - 0,75 l/ha
Sandia <i>Citrullus lanatus</i>	Mildiu polvoso <i>Erysiphe cichoracearum</i>	0,5 - 0,75 l/ha

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se realizan 2 aplicaciones durante el ciclo del cultivo; la primera entre los 15 a 30 días después de la germinación para el control de Rhizoctonia solani y la segunda aplicación entre los 80 y 95 días después de la germinación para el control de Pyricularia oryzae y Helminthosporium sp.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 0 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas, o usar equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayor parte de los fungicidas, insecticidas y coadyuvantes. No se recomienda mezclar con materiales fuertemente alcalinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Manténgase alejado de los niños y personas inexpertas. No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, ropa, utensilios de uso doméstico. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto. No es inflamable.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Nocivo por inhalación. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Enrojecimiento, lagrimeo.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Lave la boca con abundante agua. No inducir el vómito a personas inconscientes y Consulte a un médico inmediatamente.

INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte a un oftalmólogo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico.

Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Hospital Escuela	Honduras	232-2322 / 232-2316
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	289-4514
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADOR:

ADAMA MAKHTESHIM, Ltd.
P. O. BOX 60, BEER-SHEVA 84100, ISRAEL
TELÉFONO: 972 (8) 629-6619
FAX: (972) 8- 629-6019

ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA
Calle 1 C 7-53 Interior Zona Franca
Barranquilla, Colombia
TEL.: (571) 5-3799771,
FAX: (571) 5-3799715

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO REGISTRO	FECHA REGISTRO
HONDURAS	395, F223, TII	20-06-08
NICARAGUA	MC-178B-1-2007	02-08-07
PANAMÁ	5054	07-09-07