



Ficha Técnica Brevis 15 SG

BREVIS 15 SG

INGREDIENTE ACTIVO	Metamitrona
NOMBRE QUÍMICO	4-Amino-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-ona
GRUPO QUÍMICO	1,2,4-triazinonas
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	150 g/kg
MODO DE ACCIÓN	Sistémico
FABRICANTE/ FORMULADOR	Adama Agan Ltd., Israel
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Adama Chile S.A.
TOXICIDAD	Grupo II. Producto moderadamente peligroso
LD50 producto comercial:	

oral en rata (mg/kg): 500 mg/kg
dermal en rata (mg/kg): > 2000
inhalación en rata /mg/l/4h): >5.1 mg/L
No tiene antídoto específico. Tratamiento base.
N° 4247

ANTÍDOTO
AUTORIZACIÓN SAG

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

BREVIS 15 SG es un inhibidor de la fotosíntesis que al aplicarlo sobre los cultivos genera una baja en la producción de carbohidratos, produciendo un estrés que genera una mayor competencia por los foto asimilados.
Uso para raleo en manzanos, de acuerdo a lo indicado en el cuadro de instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Manzano	1,1 – 4,4 Kg/ha	Realizar hasta 2 aplicaciones por temporada desde 80 - 90% caída de pétalos hasta 10 - 12 mm de diámetro de fruto rey, dependiendo de la carga frutal, patrón, vigor de la plantación y condiciones climáticas. Para definir dosis y momento de aplicación se debe consultar a un especialista antes de la aplicación. Mojamiento 1.000 - 1.500 L de agua por hectárea, dependiendo del vigor y edad de los árboles. No superar los 4.4 Kg/ha por temporada*

* Dosis máxima por hectárea por temporada

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Aplicación por aspersión (nebulizadora). Las aplicaciones se deben realizar con nebulizadoras que aseguren un mojamiento homogéneo en el árbol.

Agregar la cantidad de **BREVIS 15 SG** al estanque parcialmente lleno de agua bajo agitación constante. Completar el resto de agua manteniendo la agitación.

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 |

adama.com/chile



Ficha Técnica Brevis 15 SG

PRECAUCIONES

Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento, no aplicar con temperaturas superiores a 25°C. No aplique BREVIS 15 SG en un plazo de 5 días después de haberse producido una helada o si se espera que pueda producirse. Aplicar BREVIS 15 SG con un periodo libre de lluvias mayor a 2 horas.

Evitar la deriva a otros cultivos, en especial a cerezos.

FITOTOXICIDAD

Genera diferentes grados de fitotoxicidad, dependiendo de la dosis y del número de aplicaciones realizadas, pudiendo presentarse daños caracterizados por amarillez intervenal y leve necrosis en el borde de la hoja de no más de 1 cm de ancho.

INCOMPATIBILIDAD

No debe ser aplicado en mezcla con otros preparados.
Una vez preparado el producto en agua, aplíquelo el mismo día.

COMPATIBILIDAD

No debe ser aplicado en mezcla con otros preparados.
Una vez preparado el producto en agua, aplíquelo el mismo día.
Periodo de Carencia: 80 días (Manzano).

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Personas y animales no deben reingresar al área tratada hasta 24 horas luego del secado de la aplicación.

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 |

adama.com/chile