



ADAMA

# ExelRoot®

Bioestimulantes que maximizan  
y promueven el rendimiento

Distribuye



Escuchamos • Aprendemos • Solucionamos

ADAMA.COM



# ExelRoot®

**Bioestimulante diseñado para uso radicular en base a un proceso de biofermentación (exclusivo de Adama) de algas de *Ascophyllum nodosum* y aminoácidos en un perfecto balance para promover el crecimiento y el desarrollo de la raíz, favoreciendo la capacidad de la planta para absorber agua y nutrientes desde el suelo.**

- Promotor de crecimiento y desarrollo radicular.
- Mejora la capacidad de absorción de agua y nutrientes en la planta.
- Aumenta los puntos de contactos y absorción entre la planta y el suelo.

CULTIVOS	DOSIS LT/HA	MOMENTO Y NÚMERO DE APLICACIONES
FRUTALES DE CAROZO, CEREZOS, MANZANOS, KIWI, ALMENDROS, NOGALES, AVELLANOS, OLIVOS, CÍTRICOS, PALTOS Y BERRIES	3-5	Aplicar al iniciarse el crecimiento de raíz, en primavera y otoño. Debe aplicarse al suelo en línea con la copa del árbol con suficiente agua, aproximadamente 600 L. Puede ser aplicado vía el sistema de riego por goteo precaviendo aplicar en el último tercio del riego, de tal manera que el producto quede retenido en la zona de mayor concentración de raíces (primer tercio superior del suelo generalmente).
UVA DE MESA	3-5	600 L. Puede ser aplicado vía el sistema de riego por goteo precaviendo aplicar en el último tercio del riego, de tal manera que el producto quede retenido en la zona de mayor concentración de raíces (primer tercio superior del suelo generalmente).
ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO PARA ÁRBOLES FRUTALES	1-3	Aplicar 7 días después de trasplante o cuando se active el sistema radicular de la planta. Debe aplicarse al suelo en banda o bajo hilera de riego con suficiente agua, 500 a 600 L de agua aproximadamente.
CUCURBITÁCEAS	0,5-1	Aplicar en el primer riego después de trasplantar. Repetir 1 a 2 veces cada 15 días.
PAPA Y TUBÉRCULOS	1	Aplicar al surco de plantío.
CEBOLLA, AJO Y OTROS CULTIVOS DE BULBO	1-3	Aplicar en el primer riego después de trasplantar. Repetir una vez a los 15 días.
TOMATE, PEPINO, PIMIENTOS, BERENJENAS Y OTROS	1-3	Aplicar en el primer riego después de trasplantar. Repetir una vez a los 15 días.
PLANTACIONES FORESTALES	1-3	Aplicar 7 días después de trasplante o cuando se active el sistema radicular de la planta. Debe aplicarse al suelo en banda o bajo hilera de riego con suficiente agua, 500 a 600 L de agua aproximadamente



**ADAMA**

Estamos en las redes     @AdamaChile

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56 2 2855 0048 | adama.com

Distribuye

