



RadiGrow[®] XL

Bioestimulante de Raíces



Bioestimulante

Análisis Garantizado

Fósforo (P ₂ O ₅)	1,34 %p/v	(13,4 g/L)
Ácidos Carboxy [®]		
<i>expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total</i> ..	5,60 %p/v	(56,0 g/L)
Coformulantes c.s.p.....	100 %p/v	(1L)

Solubilidad en agua: 100%, a 20 °C

pH: 6,5

Densidad: 1120 g/L, a 20 °C

Fecha de Caducidad: 3 años después de su fecha de fabricación.

Contenido:
10 L



GTIN

Fecha Formulación

No. de Lote

Importado y Distribuido por:



Adama Chile S.A.

Cerro Colorado 5240, Torres del Parque II,
Of. 1602, Las Condes, Santiago, Chile.
Tel.: 562 28550048
www.adama.com/chile/es



Fabricado por:



Innovak Global, S.A. de C.V.

Bldv. Vicente Lombardo Toledano #6615

Col. Concordia Chihuahua, Chih. México C.P. 31375

Tel. (614) 436-0138 Fax (614) 415-4770

www.innovakglobal.com

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado y completo: overol o camisa de manga larga y pantalón, mascarilla para polvos, lentes industriales, guantes y botas de hule. Después de una jornada de trabajo, báñese y use ropa limpia.

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”.

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de ingestión accidental: Enjuague la boca con abundante agua y suministre un álcali débil (bicarbonato de sodio).

En caso de contacto cutáneo: Quite toda la ropa contaminada. Ponga la piel en contacto con agua corriente (ducha o manguera) en abundancia. Lave el área afectada con agua corriente y jabón, seque perfectamente la piel y póngase ropa limpia.

En caso de contacto ocular con el producto: Mantenga los párpados abiertos e inmediatamente lave el ojo con una corriente moderada de agua. Continúe lavando cuando menos por 15 minutos, si la irritación persiste consulte a su oftalmólogo.

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

Metales Pesados	Menor a: (ppm)
Arsénico (As)	2,0
Cadmio (Cd)	2,5
Mercurio (Hg)	4,0
Plomo (Pb)	3,3

INSTRUCCIONES DE USO: SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Radigrow® XL es una formulación que contiene extractos concentrados de cascarillas agrícolas **ECCA Carboxy®** que promueve el crecimiento de raíces mejorando la absorción de nutrientes por periodos prolongados sin restricciones para su desempeño y de manera segura, en cualquier etapa fenológica del cultivo.

USO: Radigrow® XL debe ser aplicado mezclado con suficiente agua para lograr una adecuada cobertura de cultivo.

DOSIS:

Cultivo	Dosis (L/ha)	Nº de aplicaciones	Momento de aplicación
Vides de mesa	1-3	2-3	* Inicio de brotación. * Periodo de crecimiento vegetativo. * Cuaja a llenado de frutos.
Vides para vino			
Manzanos, Perales, Carozos, Kiwis			
Frutales de nuez	2-3	1-2	* Inicio de brotación. * Cuaja a llenado de frutos.
Berries	1-3	1-2	* Inicio de brotación (crecimiento vegetativo). * Cuaja a llenado de frutos.
Tomates, Aji, Pimientos	1-3	2-3	* Una semana después de trasplante. * Inicio de floración. * Después de primer corte.
Cucurbitáceas	1-2	2-3	* Una semana después de trasplante. * Inicio de floración. * Después de primer corte.
Brásicas	1-3	1-2	* Una semana después de trasplante. * Inicio de pan floral.
Hortalizas de bulbo y raíz (Cebollas y Ajos)			
Cítricos	2-3	1-2	* Inicio de brotación. * Inicio de llenado de fruto.
Paltos			
Olivos			
Papas	2-3	1	* A la siembra

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad. Mida la cantidad a aplicar en recipiente graduado y vierta en cubeta para predilución.

En micro aspersión y riego por goteo: Agregue al tanque fertilizador la mitad del volumen de agua a aplicar. Vierta la solución obtenida de la predilución. Agite y complete el total del volumen de agua.

Por drench dirigida a la base del tallo de la planta: Verter la predilución en el tanque de la mochila aspersora y aplique en drench.

INCOMPATIBILIDAD:

En caso de realizar una mezcla con otros productos, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad para evitar posibles riesgos de incompatibilidad. Las mezclas que se realicen, deberán ser con productos registrados en los cultivos autorizados.

GARANTÍA: Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sido almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, Innovak Global, S.A. de C.V. no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo errado o uso de productos expirados o mal conservados.

ATENCIÓN A CLIENTES



+52 614 436 00 66

RadiGrow® XL