



Ficha técnica :

Sphinx®

REGISTRO N° 122 – F2/NA

TITULAR: ADAMA ANDINA B.V.



FUNGICIDA

Tipo de producto:	Fungicida Agrícola.
Formulación:	Suspensión Concentrada (SC).
Ingrediente activo	Dimethomorph.
Concentración:	500 gramos por litro.
Categoría Toxicológica:	II (Moderadamente Peligroso).
Cultivos:	Papa, Melón y Cebolla
Objetivo Biológico:	<i>Phytophthora. Pseudoperono, spora, Peronospora sp.</i>
Presentación:	1 l , 250 ml, 500 ml, 120 ml
Grupo químico:	<i>Morpholine</i>

Modo de acción:

Tiene propiedades sistémicas (Local) con buena actividad protectante y antiesporulante. Cuando es aplicado al suelo, Dimethomorph se mueve acropétalmente desde la raíz hacia las hojas en crecimiento.

Mecanismo de acción:

Afecta la formación de la pared celular del patógeno, inhibiendo la biosíntesis de fosfolípidos, que son parte fundamental de la estructura de la pared celular.

Riesgo de resistencia:

Se han reportado casos de resistencia en el mildew vellosos de la vid (***Plasmopara vitícola***), pero no en gota (***Phytophthora infestans***). Dimethomorph presenta resistencia cruzada con otros fungicidas del mismo grupo (Amidas del Ácido Carboxílico, o CAA, por sus siglas en inglés), como bentiavalicarb, iprovalicarb y mandipropamid.

Generalidades:

Sphinx es un fungicida altamente efectivo para el control de patógenos oomicetos como la gota en papa y tomate, o mildius vellosos que afectan cultivos como rosa, cebolla y vid. Una vez ha penetrado a la planta posee un control prolongado sobre el patógeno, con actividad fungicida hasta de 12 días, debido a la alta estabilidad de la molécula (en condiciones de laboratorio, se ha determinado que la degradación aeróbica de Dimethomorph puede tardar hasta 47 días).

ADAMA

ADAMA Andina B.V. Sucursal Ecuador, Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point", piso 5to, oficina 506
Guayaquil – Ecuador PBX: + (593) 2597919 – 3883800 | www.adama.com



Sistema de preparación y aplicación:

Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de Propamecure en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta $\frac{1}{4}$, agitar y completar el volumen de agua recomendado, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea.

Aunque Dimethomorph afecta la germinación de las esporas, se ha encontrado mayor control del patógeno cuando es aplicado en mezcla con fungicidas protectantes como Chlorothalonil (Odeon 720 SC), Mancozeb (Profizeb 80 WP), para lograr una mayor uniformidad y cobertura del producto en el área tratada, se recomienda realizar aplicaciones con un dispersante foliar. Para asegurar la eficacia de **Sphinx**, realizar la aplicación en la dosis y periodos recomendados, adecuada calidad del agua (pH: 5-7 y dureza máxima de 300 ppm de CaCO₃), y buena cobertura del área foliar aplicada (equipo de fumigación y boquillas en óptimas condiciones).

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,40 l/ha
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mildiu (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,80 l/ha
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Mildiu (<i>Peronospora</i> sp.)	0,20 l/ha

Gasto de Agua: papa: 400 l / ha; melón 200 l / ha

Época y frecuencia de aplicación:

Iniciar aplicaciones de **Sphinx** cuando se observen los primeros síntomas del patógeno en la planta, o cuando las condiciones del ambiente sean altamente favorables para su desarrollo (humedad relativa alta por períodos prolongados en el cultivo). Para evitar la pérdida de sensibilidad del patógeno al producto, no se recomienda realizar más de ocho aplicaciones en el año o ciclo del cultivo (la suma de las aplicaciones en el año no deben exceder los 3000 gramos de ingrediente activo/Ha).

Periodo de reingreso:

24 horas, si requiere ingresar antes use equipo de protección.

ADAMA



Periodo de carencia:

Para Papa de 7 días; para Melón es de 3 días y cebolla es 14 días

Fitotoxicidad:

Usado a las dosis y con los métodos de aplicación recomendados no presenta fitotoxicidad en los cultivos.

Compatibilidad:

Compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas comúnmente usados. Se recomienda sin embargo, bajo responsabilidad del usuario, que en casos de mezclas de tanque con otros plaguicidas, se realice previamente una prueba de compatibilidad, observando las plantas tratadas en los tres días siguientes a la aplicación, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar.

Elaborado por:

Departamento Técnico ADAMA

Fecha de actualización:

01-06-2021 (PARB).

ADAMA