



ADAMA

Listen • Learn • Deliver



Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Monumental Plaza 7^{ος} όροφος Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα | Τηλ.: 211 120 5555, Fax: 211 120 5559

Θεσ/νίκη: Τ.Θ. 343, ΤΚ 57008 Ιωνία | Τηλ.: 2310 784931-6, Fax: 2310 780453



ADAMA

SULCOTREK[®] SC

Δείτε τη διαφορά με ένα πέρασμα!

Ταχύτατη δράση
Μεγάλη υπολειμματική διάρκεια
Αξιοπιστία

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο
για την καταπολέμηση
των πλατύφυλλων ζιζανίων
στον αραβόσιτο.



ADAMA.COM

Διπλή επίθεση στα ζιζάνια του καλαμποκιού με ένα πέρασμα!

- ❖ Το Sulcotrek, είναι εκλεκτικό προφυτρωτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση κυρίως πλατύφυλλων και ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού.
- ❖ Είναι μίγμα sulcotrione με terbuthylazine
- ❖ **Δράση:** από τις ρίζες και τα φύλλα των ζιζανίων
- ❖ **Sulcotrione:** Ταχύτητα στη δράση
- ❖ **Terbuthylazine:** Μεγάλη υπολειμματική διάρκεια



Τραχύ βλήτο



Αγριοντοματιά



Τάτουλας



Λουβουδιά

Πλεονεκτήματα

- ❖ Απλή λύση με άριστη σχέση κόστους ωφέλειας.
- ❖ Ευελιξία και μεγάλο παράθυρο εφαρμογής.
- ❖ Σιγουριά στο αποτέλεσμα: Ταχύτητα δράσης διασυστηματικότητα μεγάλη υπολειμματική διάρκεια.
- ❖ Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στην καλλιέργεια του καλαμποκιού, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του προϊόντος.
- ❖ Συνδυάζεται με το Nicogan 4 OD για την ταυτόχρονη καταπολέμηση και των αγρωστωδών ζιζανίων.

SULCOTREK® SC

Εγκεκριμένο Φάσμα Δράσης

sulcotrione 17.3%
terbuthylazine 32.7%

A.A.Δ.Α: 70287 /20.07.2018
Η/Μ τροποποίησης: 13.12.2021

Φάσμα δράσης

| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | ΔΟΣΕΙΣ (Κ.ΕΚ/ΣΤΡ.) | ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡ.) | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Αραβόσιτος | 200 - 260 | 30 - 50 | Προφυτρωτικά της καλλιέργειας ή χωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας στα 1 - 5 φύλλα |

Στόχοι

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Προφυτρωτική εφαρμογή:

- ❖ **Ετήσια ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:** Αγριοβαμβακιά, Αγριοπιπεριά, Αγριοτοματιά, Αντράκλα, Άσπρο βλήτο, Βλήτο τραχύ, Λουβουδιά, Τάτουλας.
- ❖ **Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια :** Μουχρίτσα.

Μεταφυτρωτική εφαρμογή:

- ❖ **Ετήσια ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:** Αγριοβαμβακιά, Αγριομελιτζάνα, Αγριοτοματιά, Βλήτο, Βλήτο τραχύ, Καψέλλα, Σκαρολάχανο, Τάτουλας.
- ❖ **Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια :** Μουχρίτσα, Αιματόχορτο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- (1) Η χαμηλή δόση να εφαρμόζεται σε ελαφριάς, ενώ η υψηλότερη σε μέσης ή βαριάς σύστασης εδάφη.
- (2) Αποφεύγετε την χρήση του σε πολύ αμμώδη, ελαφρά, φτωχά σε οργανική ουσία (< 1%) εδάφη σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις.
- (3) Μετά την εφαρμογή εάν δεν ακολουθήσει βροχή τουλάχιστον 10 - 15 χιλιοστών εντός δύο εβδομάδων να εφαρμοσθεί ελαφρύ πότισμα.
- (4) Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργειες αραβόσιτου που προορίζονται για σποροπαραγωγή.

Προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής

