



Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή.**

Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:**

Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

*Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

**Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:**

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,** ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση εισπνοής,** μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκούραστο.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,** αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό.

**Σε περίπτωση κατάποσης,** καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



# Dimbo® 480SL

**Dicamba (Ντικάμπα) 48% Πυκνό διάλυμα**

## Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων ηλιατόφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:**

Dicamba .....48% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες .....58,41% β/β

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήτες**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Αριθμός Παρτίδας:     | ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία παραγωγής: |                           |

A.A.Δ.A.: 70136/19.10.2015

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 600 Κ.ΕΚ.**



**ADAMA**

Κάτοχος της Άδειας:  
**Gharda Chemicals Europe Limited**  
Core B, Block 71, The Plaza  
Park West, Dublin 12, Ιρλανδία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
**ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

**ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**

Λεωφ. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 15125 Μαρούσι  
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

**ΝΤΙΜΠΟ:** Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων ηλιατόφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα των ζιζανίων, μεταφέρεται σε όλο το φυτό και συσσωρεύεται στα μέρη όπου υπάρχει υψηλός μεταβολικός ρυθμός.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Καθοδική ψεκασμός με 25-30 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μέχρι 3 ατμόσφαιρες.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Ανακινήστε τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη δόση του ακευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώσουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:**

Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

**ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:** Πηλυτόφυλλα ζιζάνια(\*). Δόση: 50-75 κ.εκ/στρέμμα. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά, όταν ο αραβόσιτος έχει 2-6 πραγματικά φύλλα.

**Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 25-30 λίτρα/στρέμμα.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος:** Μία (1) εφαρμογή.

**Παρατηρήσεις:**

\***Καταπολιούμενα ζιζάνια:** Αγριοτοματί, Αγριοπιπεριά, Άγριο σιτάρι, Αναρριχόμενο πολύγονο, Ασπράγκαθο, Ζωχός, Κίραιο†, Λουμβούδι, Πολλοκύμιο, Πορφυρό ἄμμο, Τραχύ βλήθι, *Artiplex sp.*

† Καταπολιούμενα καλύτερα με τη μεγαλύτερη δόση.

Ο ψεκασμός να γίνεται απουσία ανέμου. Αποφύγετε τη μεταφορά ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε βαμβάκι, σόγια, τομάτα, αγγούρι και μαρούλι.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΎΦΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια αραβόσιτου που προορίζεται για απορρυπαντική και σε γήλιο καλαμποκά.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:** Σε περίπτωση απουσίας της καλλιέργειας, μπορεί να επαρεί μόνον αραβόσιτος μετά από ὄργωμα.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:** Σε προγράμματα αμειψισποράς, μετά τον αραβόσιτο, μπορεί να καλλιεργηθεί οποιαδήποτε καλλιέργεια το φθινόπωρο ή την ἐπόμενη άνοιξη, μετά από ὄργωμα.

**ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (24 ὥρες).

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Δεν ὀρίζεται. Καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε αρωματώδη ἔδαφος.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:** Αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα και ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

05/2023-11