

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (νευρικό σύστημα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / αεροζόλια.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος στον αγρό ή ολόσμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή του σκευάσματος στο θερμοκήπιο.
Σε περίπτωση επαπειλούδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μπότες, ολόσμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήνεται μια αφέκοψη ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα: ●10 μέτρα για το σιτάρι και κριθάρι, ●15 μέτρα για το βαμβάκι, ●20 μέτρων για μη-δική, γογγύλια, σελανόριδα, πατάτα, τομάτα, λαχανάκια Βρυξελλών, κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, κινέζικα λάχανα, ●25 μέτρα για την ελαιοκράμβη, ●50 μέτρα για το αμπέλι.
Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφέκοψη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες του αμπελού και των κηρυττικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 εκ.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικουριστικά, μην το εφαρμόζετε κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία εάν το προϊόν πρόκειται να εφαρμοστεί.
Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε οσάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα χρώσει χρησιμοποιήσετε. **Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα,** συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα κρατώντας τα ανοιχτά, με άφθονο νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εάν η ποσότητα είναι μικρή (όχι περισσότερο από μία μπουκιά), ξεπλύνετε το στόμα με νερό και συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Αν τα συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον παθόντα σε ένα Κέντρο Υγείας και δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή την ετικέτα αν είναι δυνατόν.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777



ΠΡΟΣΟΧΗ

Assist® 100EW

**Συγερmethrin (Συπερμεθρίν) 10%
Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό**

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Συγερmethrin10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες91,55% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

UFI CODE : TNF9-JFY3-7KOM-7AT9

Αριθμός Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

A.A.Δ.A.: 14.571/24.06.2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ



ADAMA

Κάτοχος της 'Αδειας:
SBM Developpement
60 Chemin des Mouilles, Ecully 69130, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφ. Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, 15125 Μαρούσι,
Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

ΑΣΙΣΤ 100:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευρώνες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μη συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης σκελεϊ ανιτρορκική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλιζοντας πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό κατά 3/4 και προσθέτουμε αναοδόντας την συνιστάμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναοδόντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Τριπλό ξέπλυμα.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο & Οινολοίπηση): Ευδεμίδα, Κοχυλίδια, Τζιτζικία, Τσιγορολόγος, Πυραήδια. Δόση: 30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ):** Πρόσνο ακουήκη, Σποντόπτερα, Φθορομιάδα, Πιερία, Πιουτέλλα, Μομίστρα, *Autographa* sp., Αγρότις ή Καρασάμειος, Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Δουροφόρος, *Diabrotica* spp., Τζιτζικία. Δόση: 30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΠΑΤΑΤΑ:** Αφίδες, Δουροφόρος, *Pteromalpa oregonensis*. Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ-ΛΑΧΑΝΟ-ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ-ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ-ΓΟΥΓΥΛΙΑ-ΣΕΛΑΝΟΡΙΔΑ:** Άλτις, Δουροφόρος, Αλευρώδης, Αφίδες, *Diabrotica* sp., Τζιτζικία, Θρίπες, Πρόσνο ακουήκη, Σποντόπτερα, Φθορομιάδα, Πιερία, Πιουτέλλα, Μομίστρα, *Autographa* sp., Αγρότις ή Καρασάμειος. Δόση: 30-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Προνύμφες Ασιδοπτερών, Πρόσνο ακουήκη, Ρόδινο ακουήκη, Ακανθώδης ακουήκη, Διπόροψη, Αγρότις, Σποντόπτερα, Αφίδες, Αλευρώδης, Θρίπες, Δόση: 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΣΙΤΑΡΙ-ΚΡΙΘΑΡΙ:** Αφίδες, Άλτις, Δόση: 85-125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ:** Αφίδες, Δόση: 85-125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 25 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΜΗΔΙΚΗ:** Προνύμφες Ασιδοπτερών, Φυτονόμος, Πρόσνο ακουήκη, Ρόδινο ακουήκη, Ακανθώδης ακουήκη, Διπόροψη, Αγρότις, Σποντόπτερα, Αφίδες, Αλευρώδης, Θρίπες. Δόση: 25-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΓΡΑΣΙΔΙ (ΓΚΑΖΟΝ):** Αλευρώδης, Αφίδες. Δόση: 100-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. **ΚΑΛΗΛΟΠΙΣΤΙΚΑ:** Αλευρώδης, Αφίδες. Δόση: 20-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό ή 30 κ.εκ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.): Αμπέλι-Τομάτα (Υ+Θ)-Βαμβάκι (50-100), Πατάτα-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λάχανο-Λαχανάκια Βρυελλών-Κινέζικα Λάχανα-Γογγύλια-Σελανόριδα (140-100), Σιτάρι-Κριθάρι-Ελαιοκράμβη-Γρασίδι (Γκαζόν) (20-30), Μήδικη (40-120), Καλλιπαστικά (100-150).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλιεργητική περίοδος: Αμπέλι-Τομάτα (Υ+Θ)-Πατάτα-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Λάχανο-Λαχανάκια Βρυελλών-Κινέζικα Λάχανα-Γογγύλια-Σελανόριδα-Σιτάρι-Κριθάρι-Ελαιοκράμβη-Μήδικη-Γρασίδι (Γκαζόν)-καλλιπαστικά (2), Βαμβάκι (1).

ΕΙΔΙΚΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΓΕΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΘΕΙ:

Π.χ. Διακείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα, κ.λ.π. Παρατηρούμε: Είναι προτιμότερο ο εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25°C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών. Το μείγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε κατάλοιπα στο ψεκαστικό μέσο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Ελαιοκράμβη: 28 ημέρες
Σιτάρι, Κριθάρι: 21 ημέρες
Αμπέλι, Πατάτα, Βαμβάκι, Σελανόριδα, Μήδικη: 14 ημέρες
Τομάτα (Υ), Λαχανάκια Βρυελλών, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Κινέζικα Λάχανα, Γογγύλια: 7 ημέρες
Τομάτα (Θ): 3 ημέρες
Γρασίδι (Γκαζόν)-Καλλιπαστικά: Μην εφαρμόζομαι.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Να αποθηκεύεται, καλά κλειστό, στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.



04 / 2024 - 4