



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19.04.2024
Αριθ. πρωτ: 4596/115009

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λ. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165
e-mail: lapocha@minagric.gr

Προς: LAINCO S.A., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και
ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14.605 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LAINCOIL [paraffin oil (cas 8042-47-5) 79% β/ο] ως προς τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45.
- Το αριθμ. 79/2023 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 131/27.06.2023)
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 1756/17293/28.03.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14.605 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LAINCOIL [paraffin oil (cas 8042-47-5) 79% β/ο] όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την από 09/2022 έκθεση αξιολόγησης της Ιταλίας.

8. Την αριθμ. 3763/99251/08.04.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και την συμπληρωματική αίτηση αυτής με αριθμ. 7876/223461/13.07.2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 14.605 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LAINCOIL [paraffin oil (cas 8042-47-5) 79% β/ο], που χορηγήθηκε με την αριθμ. 1756/17293/28.03.2017 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **2, 5, 10, 11** και **17** διαμορφώνονται ως εξής:

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	375 έως 1 λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE / EVOH), HDPE
2	Δοχεία	3 έως 60 λίτρων	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE / EVOH), HDPE, HMW-HDPE

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. /100 λίτρα υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/ στρ.)	κ.εκ. / στρ		
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ Γκρεΐτ φρούτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, μανταρινιά (Κλημεντίνες) CIDRE, Πορτοκαλιά CIDSJ, Φράπα CIDGR.	Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i> - AONDAU) Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i> - ASPDNE) Παρλατόρια/Μαύρη ψώρα (<i>Parlatoria pergandei</i> - PARLPE) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes beckii</i> - LEPSBE) Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Ακάρεα (<i>Eutetranychus banksi</i> - EUTEBA, <i>Panonychus citri</i> - METTCI)	1000 - 1500	100-200	1000 - 3000	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών.	1

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά ΜΑΒSD, Αχλαδιά ΡΥUCO, Κυδωνιά CYDOB, Μουσμουλιά MSPGE, Αχλαδόμηλα ΡΥUPC	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> -QUADPE) Βαμβακάδα* (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> - PSEAPE) Ψευδόκοκκος* (<i>Planococcus citri</i> PSECCI) Ψώρες* (<i>Eriococcus lagerstroemiae</i> ERIOLA) Ματόψειρα* (<i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA)	750 - 1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠ Α Βερικοκιά PRNAR Κερασιά PRNAV Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO	Ψώρα Σαν-Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> -QUADPE) Βαμβακάδα (<i>Pseudalacaspis pentagona</i> -PSEAPE). Κίτρινος τετράνυχος* (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)	750 - 1000	50-150	375-1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Αμυγδαλιά* PRNDU	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> -QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudalacaspis pentagona</i> - PSEAPE) (<i>Planococcus /Pseudococcus citri</i> -PSECCI) (Diaspis-DIASSP) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> -SAISOL) Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae</i> -PARLOL) Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i> -LEPSUL) Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes rusci</i> -CERPRU)	750 - 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

	<p>Ψώρες (<i>Sphaerolecanium prunastri</i>-LECAPN) (<i>Eulecanium persicae</i>-LECAPE) Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>-TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i>-METTUL) Παραμορφωτικό ακάρι (<i>Aceria sheldoni</i>-ACEISH) Ακάρεα (<i>Aculus pelekassi</i>-ACULPE) (<i>Bryobia rubrioculus</i>-BRYORU)</p>					
Φουντουκιά* CYLAV	<p>Βαμβακάδα (<i>Diaspis</i>-DIASSP) Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>-TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i>- METTUL) Ακάρεα (<i>Bryobia praetiosa</i>-BRYOPR)</p>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1
Φιστικιά* PIAVE	<p>Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>-TETRUR) Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i>-SAISOL) Ψώρες (<i>Parthenolecanium pruinsum</i>- LECAPI) (<i>Parthenolecanium corni</i>- LECACO) (<i>Coccus hesperidum</i>-COCHE)</p>	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

Ελιά OLVEU	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> - SAISOL)	750 – 1500	50 – 100	375 – 1500	Εφαρμογή από τη συγκομιδή μέχρι την άνθιση BBCH 00-59 ή από την πτώση των πετάλων έως την έναρξη της πήξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου (μέγεθος 50% του τελικού) BBCH 71-75	1
	Παρλατόρια* (<i>Parlatoria oleae</i> - PARLOL) Πολλίνια * (<i>Pollinia pollini</i> - POLNPO) Άσπρη ψώρα* (<i>Aspidiotus nerii</i> - ASPDNE) Μυτιλόμορφη ψώρα* (<i>Lepidosaphes ulmi</i> - LEPSUL) Ψώρες* (<i>Leucaspis riccae</i> - LEUARI) (<i>Chrysomphalus</i> <i>dictyospermi</i> - CHRYDI) Ακάρεα * (<i>Eriophyes vitis</i> - ERPHVI) (<i>Tegolophus</i> <i>hassani</i> -TEGLSP) (<i>Oxycenus maxwelli</i> - OXYNMA) (<i>Eotetranychus</i> <i>carpini</i> -EOTECA)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

Αμπέλι VITVI	Ψώρα <i>Parthenolecanium corni</i> (LECACO) Ψευδόκκοκος <i>Planococcus citri</i> (PSECCI)	750 – 1500	50 – 100	375 – 1500	Χειμερινή εφαρμογή πριν την άνθιση BBCH 00-57 Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθιση	1
	Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Κόκκινος τετράνυχος <i>Ranonychus ulmi</i> (METTUL)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθιση	1
Ροδιά* PUNGR	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> TETRUR) Ακάρεα (<i>Eriophyes grannati</i> ACEIGA)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθιση	1
Συκιά* FIUCA						1

	Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i> METTUL) Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes rusci</i> CERPRU) Ψευδόκοκκος (<i>Planococcus ficus</i> PLANFI)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	
Ακτινιδιά* ATIDE	Κίτρινος Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> -TETRUR) Κόκκινος Τετράνυχος (<i>Metatetranychus ulmi</i> -METTUL) Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> -QUADPE) Βαμβακάδα ή Διάσπις (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> - PSEAPE)	750 – 1000	50 – 150	375 – 1500	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των φυτών και την ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του LANCOIL τα δένδρα πρέπει να είναι επαρκώς ποτισμένα. Ποτίζουμε μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας ή όταν υπάρχει παγετός.
4. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
5. Να μη γίνεται εφαρμογή του LAINCOIL επί 40 ημέρες, μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου ή σκευασμάτων με δ.ο. captan ή folpet.
6. Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύρος δόσης ανά 100 λίτρα και εύρος όγκου ψεκαστικού υγρού, να μην ξεπερνάτε τη μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ.) ανά στρέμμα, όπως έχει οριστεί για κάθε καλλιέργεια

* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ελιά (στους ήσσονος σημασίας εχθρούς Παρλατόρια, Πολλίνα, Άσπρη ψώρα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Ψώρες, Ακάρεα), Αμπέλι (σε Ψευδόκοκκο ή Βαμβακάδα και Ερίνωση), Ροδιά (σε Τετράνυχο και Ακάρεα), Συκιά (σε Κίτρινο τετράνυχο, Κόκκινο τετράνυχο, Κηροπλάστη και Ψευδόκοκκο), και Ακτινιδιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξεις.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Sr1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
 Sre3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 5 μέτρων σε Εσπεριδοειδή, **Ροδιά**, και 10 μέτρων σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα, **Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ελιά, Αμπέλι, Συκιά και Ακτινιδιά.**
 Sre3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.
SRe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατεύσετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

–

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1756/17293/28.03.2017 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ