

# סטארנר STARNER

אבקה רטיבה להדברת מחלת החירכון באגס, תפוח, חבוש ושסק.

מכיל: Oxolinic acid 20%

**הוראות השימוש:**

**באגס, תפוח, חבוש**

הריסוסים יבוצעו רק במהלך הפריחה. מועדי הריסוסים ייקבעו על פי התאמת תנאי הסביבה להדבקה, בהתייעצות עם אנשי שרות ההדרכה והמקצוע.

הגידול	המחלה	הריכוז	נפח התריס
אגס, תפוח, חבוש	חירכון	0.2-0.15%*	150-100 ל'/'ד' לפי גודל העצים.

**בשסק**

הגידול	המחלה	הריכוז	נפח התריס
שסק**	חירכון	0.2-0.15%*	150-100 ל'/'ד' לפי גודל העצים.

**הערות:**

\*המינון הגבוה ייושם במטעים בהם הייתה נגיעות בעונה הקודמת.  
\*\*טפול ראשון יש לבצע מתחילת הפריחה ולהמשיך בטפולים סדירים בהתאם להתפתחות הפריחה ותנאי מזג האוויר.

**שילובים:**

ניתן לשלב את הסטרנר עם רוב התכשירים להדברת גרב וקימחון. אין לשלב עם תכשירי גופרית. לא נבדקו שילובים עם קוטלי חרקים. ניתן לשלב עם נחושתן באגס.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.



ADAMA  
אגן

מס' הרישוי של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 96/הנה"צ/1383  
• דרגת רעילות VI - מסוכן  
• סיווג FRAC: A4  
• מיוצר ע"י חברת Sumitomo Chemicals  
• אריזות: 1 ק"ג