

# פוליו גולד FOLIO GOLD

קוטל פטריות סיסטמי להדברת כימשון בתפוח אדמה ובעגבנייה וכן להדברת כשותית בבצל - תרכיז רחיף  
מכיל : Chlorothalonil 500 g/L+ Mefenoxam 37.5 g/L

פוליו גולד הינו קוטל פטריות משולב המכיל שני מרכיבים פעילים המשלימים זה את פעולתו של זה. שני המרכיבים שייכים לקבוצות כימיות שונות ומייצגים מנגנון פעולה שונה. Mefenoxam הוא האיזומר האופטי הפעיל של מטלקסיל. קוטל פטריות סיסטמי בעל יכולת מניעתית והדברתית של פטריות רגישות מקבוצת הפיקומיצטים.  
Chlorothalonil - קוטל פטריות פרוטקטנטי רחב טווח היעיל בין היתר במניעת כימשון וחלפת בתפוח אדמה ובעגבנייה וכן כשותית וסטמפיליום בבצל.

## הוראות השימוש

יש לטפל לפני או מיד עם הופעת סימני נגיעות ראשוניים במחלה. הריסוסים יינתנו בכלי הישימה המומלצים, בנפחי תרסיס שיבטיחו כיסוי נאות של נוף הצמחים.

**גזעים עמידים** - יש לזכור כי נוכחות גזעים עמידים של כימשון למפנוקסם עלולה לפגום ביעילות ההדברה. לכן אין להשתמש בפולין גולד ברציפות אלא כחלק ממשטר ריסוסים חלופיים עם קוטלי פטריות אחרים מקבוצות כימיות שונות המומלצים למטרה זו.

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 9087/צ/הגה"צ/2019  
דרגת רעילות IV - מסוכן; כניסה לשטח המרוסס - לאחר 24 שעות

סוג: M + A1 FRAC

אריזות: 5 ליטר

מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection AG, צרפת

משווק ע"י אדמה-אגן בע"מ

**יבוא מקביל**



## טבלת השימוש

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'/ד')**	הערות	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)
תפוח אדמה	כימשון*	250	בריסוס קרקע: 10-100 בריסוס אוויר: 5-10	אין לרסס יותר מ-3 פעמים בעונה	12
עגבנייה				אין לרסס יותר מ-4 פעמים בעונה	למאכל: 5 לתעשייה: 14
בצל	כשותית		50-20	אין לרסס יותר מ-3 פעמים בעונה	7

\* מומלץ לשלב פוליו גולד עם קוטל הפטריות קורזייט במינון 60-80 ג'ד' בהתאם לעוצמת הנגיעות, כדי לתת מענה לגזעים עמידים למפנוקסם.  
\*\* בהתאם לגובה הנוף.

### שילובים:

בתפוח אדמה ובעגבנייה: התכשיר פוליו גולד ניתן לשילוב במיכל המרסס עם קורזייט כמפורט מתחת לטבלה. המרווח בין הריסוסים במעקובת עם תכשירים אחרים יהיה כ-7-10 ימים בהתאם לעוצמת הנגיעות ולתנאים המטאורולוגיים המתאימים להתפתחות המחלה.