

# ATEMI EXTRA      אטמי אקסטרה

תרכיז נוזלי.

קוטל פטריות סיסטמי להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה, מטעים, פרחים ותבלינים.

מכיל: Cyproconazole 100 g/L

כללי:

אטמי אקסטרה קוטל פטריות סיסטמי השייך למשפחת הטריאזולים. התכשיר פועל ע"י עיכוב הביויסנטזה של הארגוסטרולים בפטריות. התכשיר יעיל נגד מגוון גדול של מחלות בגידולים רבים.

הגידול	המחלה	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן עד 100 ל"ד'	הריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד'	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)
אגוזי אדמה	צרקוספורה	(1) 50-40		40
שום	סטמפיליום	(2) 50		14
	חילדון	(2) 50-40		
חמניות	חלדון	50 בריסוס		30
	קמחון	75 בהגמעה (5)		
		30 בריסוס		
חימצה	חלדון	50-25 75 בהגמעה (6)		60
חיטה	מיני חלדונות עלה, (צהוב, קנה), ספטוריה	40		60

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל'ד' מעל 100 ל'ד'	המינון (סמ"ק/ד') בנפח קטן עד 100 ל'ד' לי'ד'	המחלה	הגידול
3	0.04	40	קמחונית	עגבנייה(3), חציל (3) (בשדה פתוח בלבד)
60	0.02		קמחון	מנגו
45	0.03-0.02		קמחון	תפוח
	0.03		גרב	
21	0.02		חלדון, קמחון	אפרסק, נקטרינה
21	0.02		חלדון	שזיף יפני, שזיף אירופאי
21	0.02		חלדון, מוניליה (7), נימשון (פוליסטיגמה)	שקד
21		40	חלדון	אורגנו
17		40	חלדון	אזוב מצוי (זעתר)
				לענה, דרקונית (טרגון)
		50	חלדון	היפריקום, לימוניום מזן אמילי



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1604/הגה"צ/2000

- סיווג FRAC: G
- מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- שווק ע"י אדמה אגן
- אריזות: 1 ל, 5 ל

# ATEMI EXTRA

(המשך)

# אטמי אקסטרה

1. מינון נמוך בטיפולי מניעה, מינון גבוה בטיפולי תגובה.
2. המינון הגבוה מתייחס לנגיעות בינונית-גבוהה בשום.
3. בירקות אין לרסס יותר מריסוס עוקב אחד. אין לרסס כאשר טמפרטורת לילה יורדת מ-15 מעלות.
4. אין לרסס בראשית העונה כאשר הטמפרטורות נמוכות. בקמחון הריכוז לפי עוצמת הנגיעות.
5. יש להזריק אטמי אקסטרה מהול במים למערכת הטיפטון, במערכות השקיה מנותקות אוויר, לקראת סוף השקיה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להמשיך ולהשקות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשטיפת המערכת ולפיזור התכשיר בקרקע. ביישום בהגמעה פעילות התכשיר בצמח מתחילה כשבוע לאחר היישום, לכן יש ליישם כ-10 ימים לפני מועד מומלץ לריסוס. יישום בהגמעה החל משבועיים לאחר הפריחה יהיה יעיל פחות ובמקרה כזה מומלץ ריסוס.
6. יש להזריק אטמי אקסטרה מהול במים למערכת הטפטון, במערכות השקיה מנותקות אוויר, לקראת סוף השקיה רגילה, במשך 30-60 דקות. יש להמשיך ולהשקות עוד כשעה לאחר סיום ההזרקה לשטיפת המערכת ולפיזור התכשיר בקרקע. ביישום בהגמעה פעילות התכשיר בצמח מתחילה כשבוע לאחר היישום ונמשכת למעלה מחודש. יש להקפיד על יישום מוקדם כשרמת נגיעות נמוכה ומינון גבוה בנגיעות גבוהה.
7. למניעת מוניליה יש ליישם ריסוס ראשון בשלב פקעים ורודים ולאחר מכן לרסס לפני כל אירוע גשם צפוי.

## שילובים:

- ניתן לשלב אטמי אקסטרה עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים המופיעים בתוויות האריזה שלהם:  
אגוזי אדמה - פליקטרן.  
עגבנייה - טלסטאר, פליקטרן, מוליט, ורטימק, אוונט, אטברון, אפלורד, מוספילן, מנקו-די, קליפמן.  
חציל - טלסטאר, ורטימק, פליקטרן, אפלורד, טייגה.  
תפוח - דורסן, ורטימק, פליקטרן.  
אפרסק - מאבריק, סנסור, רוגה.  
חימצה (בריסוס) - קנון .

## הערות:

אין ליישם אטמי אקסטרה בתנאי עקה, (כדוגמא שינויים קיצוניים בטמפ' לאורך היממה) אין להשתמש בתמיסת ריסוס בסיסית בעלת pH גבוה ו/או לרסס בזמן היישום עם תכשירים מווסתי גידול (PGR).



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1604/צ/2000 / הגה"צ/1604

- אריזות: 1 ל', 5 ל'
- מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
- שיווק ע"י אדמה אגן
- סיווג FRAC: G
- דרגת רעילות IV - מסוכן