

דוריבו DURIVO

תרכיז רחיף

קוטל חרקים להדברת חרקים בגידולי שדה, ירקות, מטעים, כותנה, גפן והדרים

מכיל: Chlorantraniliprole 100 g/L + Thiamethoxam 200 g/L

כללי:

דוריבו 300 ת"ר הינו קוטל חרקים טרנסלמינרי להדברת זחלי עשים וחרקים מוצצים. דוריבו מכיל חומר להדברת חרקים מוצצים, Thiamethoxam, (קבוצה A4 - ניאוניקוטינואידים) וחומר להדברת זחלי עשים, Chlorantraniliprole (קבוצה 28) Antranilic Diamides, המשתק את החרק ע"י הפרעת פעולת קולטני Ryanodine שבתאי השריר בחרק. החרק ימות תוך מספר ימים אך הנזק נפסק מיידית. מספר סוגי חרקים (כמו למשל כנימת עש הטבק) פיתחו עמידות לתכשירים מקבוצת הניאוניקוטינואידים. דוריבו לא ידביר מזיקים אלה. אין ליישם תכשיר זה בשיטת הכמיציה.

רעיל לדבורים, אויבים טבעיים ודבורי בומבוס בריסוס ישיר. באזורים ובשעות בהם יש פעילות של דבורים חל איסור מוחלט ליישם תכשיר זה, יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים.

ממשק מניעת עמידות: למניעת התפתחות עמידות מצד המזיקים יש לרסס דוריבו לחילופין עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה ולהשתמש בשיטות הדברה אלטרנטיביות. בכל מקרה אין לרסס יותר מ-2 ריסוסים בעונה בדוריבו או בחומרים אחרים המכילים חומר פעיל מקבוצה 28 בעלי אותו מנגנון פעולה.

טבלת הוראות שימוש: עמידות חרקים לחומרים הפעילים שבדוריבו עלולה להופיע. לפיכך אין לרסס בתכשיר יותר מ-2 ריסוסים רצופים ולא יותר מ-2 ריסוסים בעונת גידול, ולהחליף עם חומרים בעלי מנגנון פעולה שונה. קיים חשש לעמידות אצל ציקדות ירוקות לתכשירים מקבוצת הניאוניקוטינואידים, ובתוכם Thiamethoxam, שבתכשיר דוריבו. לפיכך, בכל מקרה של הדברה בלתי מספקת של ציקדות, יש לחזור ולרסס בתכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה.

מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	נפח הריסוס (ל"/ד')	המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	המזיק	הגידול
14	50-20 לפי גודל הצמחים	30	עש הכרוב, עש לב הכרוב, פרודניה	כרוב, כרובית, ברוקולי
4	20	30	פרודניה	גזר
7	50-20 לפי גודל הצמחים	30	הליותיס (תנשמית האביב), פלוסיה, טוטה אבסולוטה	עגבנייה, בחממה ובשטח פתוח
3		30	פרודניה, לפיגמה	פלפל

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד" או הריכוז (%))	נפח הריסוס (ל"ד/ד")	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הערות
מלפפון	לפיגמה	30	50-25 לפי גודל הצמחים	7	
תפוח אדמה	פרודניה, לפיגמה הליתוסיס (תנשמית האביב)	30	20	7	
בטטה	מלדרה מטרידה	30	20	14	טפל מדי חודש משתילה, סה"כ 4 טיפולים, מתוכם 2 טיפולים בדורבו. יש להמטיר לאחר הריסוס בכמות של 25-30 מ"ק מים לחנם רצוי מיידית ועד 24 שעות מהריסוס. אין לטפל יותר מ-2 טיפולים בעונה בדורבו.
אפרסק, נקטרינה, משמש, שקד, שזיף	עש המשמש (אגרסיה), ציקדה ירוקה	0.03%	150-100 לפי גודל העצים	7	
אפרסק, נקטרינה, משמש, שזיף	בוגרי קפנודיס	0.03%	150-100 לפי גודל העצים	7	
אגוזי אדמה	מלדרה מטרידה	20	25-10	45	מטפלים בהתאם למועד הופעת המזיק ולמשך הדור.

דוריבו DURIVO המשך

מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	נפח הריסוס (ל"ד')	המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	המזיק	הגידול
21	200-100 לפי גודל העצים	0.03%	עש התפוח, ציקדה ירוקה	תפוח
14	150-100 לפי גודל העצים	0.03%	עש האשכול, ציקדות	גפן
-	הרטבה מלאה	0.03%	עש המנהרות	הדרים (לא מניבים)
-	25-10	30	הליותים (תנשמית האביב)	כותנה
21	200-100 לפי גודל העצים	0.03%	כחליל הרימון, כנימת עלה הדלועים, כנימת הרימון	רימון



ADAMA
אגן

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4102/הגה"צ/2012
• דרגת רעילות IV - מסוכן
• סיווג IRAC: A4 + 28
• מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
• אריזות: 1 ליטר
• משווק ע"י אדמה אגן