

דורמקס DORMEX

תרכיז נוזלי.

לשבירת תרדמה, לשיפור התעוררות ולהפגשת הפריחה עם זנים בעצי פרי נשירים וגפן.

מכיל: Cyanamide - NH₂-CN 500 g/L

הוראות שימוש:

הטיפול בדורמקס (אלזודף) ייעשה תמיד בעונת התרדמה של העצים (פרט למנגו). המועד האחרון לריסוס בתכשיר יהיה 30 יום לפני הפתיחה הטבעית של הפקעים. הריסוס יכסה היטב את הפקעים. התכשיר צורב צמחים ירוקים, לכן בעת הטיפול יש למנוע התזת התמיסה לגידולים שכנים.

כאשר דורמקס מרוסס למטרת הפגשת פריחה עם המפרים, יש להקיף שיימצאו דבורים בשטח מתחילת הפריחה.

מועד הטיפול	נפח התרסיס (לי/ד')	הריכוז* (%)	הזן	הגידול
ראשית ינואר	80-50 בהתאם לאורך הזמורות, כנדרש לכיסוי טוב של הפקעים בתרסיס	5-4	פרלט, קרדינל, סופריוור	גפן בגיל ניבה
סוף ינואר-ראשית פברואר		5-4	דן-בן חנה, סולטנינה	
30 ימים לפני התעוררות טבעית		5-4	זנים אחרים	

מטרת הטיפול והערות: לשיפור ההתעוררות, רצוי לטפל לאחר הזמירה. בכרמים שזומרים מאוחר אפשר לטפל גם לפני הזמירה. המועד המיטבי של הטיפול עשוי להשתנות משנה לשנה. רצוי לקבוע אותו עם איש מקצוע ולפי ניסיון מקומי. באזורים רגישים לקרה ולברד צריך להימנע מטיפול מוקדם.

מועד הטיפול	נפח התרסיס (ל"/ד')	הריכוז* (%)	הזן	הגידול
מחצית ראשונה של פברואר	150-100 לפי גודל העץ	4	קוסטיה, ספדונה	אגס בגיל ניבה
מטרת הטיפול והערות: להפגשת הפריחה. אם ניתן לקבוע את מועד ההתעוררות הטבעית של הספדונה, אפשר לרסס את הקוסטיה בלבד 30 יום לפני כן. ריסוס שני הזנים ביחד עשוי לסייע להגדלת פרי הספדונה.				
סוף דצמבר	150-100 לפי גודל העץ	2	ענה והזנים המפרים	תפוח בגיל הניבה (א)
מטרת הטיפול והערות: מיועד בעיקר להפגשת הפריחה. אם ניתן לקבוע את מועד ההתעוררות הטבעית של הענה, אפשר לרסס את המפרים בלבד 30 יום לפני כן. הריסוס בענה משפר את נשירת העלים ומסייע בכך להשמדת העלים הנגועים בגרב.				
סוף פברואר-תחילת מרץ	200-100 לפי גודל העץ	0.5	זהוב, גרני סמיט, גרנד, יונתן, אורליאנס, דלישס	תפוח בגיל הניבה (ב)
הערות: מיועד לשיפור התעוררות במשולב עם שמן נרופז 80 או שמן נרותר בריכוז 3%-5% שים לב! הריסוס המשולב יינתן לפחות 30 יום לפני התעוררות הטבעית. לקביעת המועד, רצוי להתייעץ עם המדריך.				
אמצע פברואר עד תחילת מרץ	100-80 לפי גודל העץ	4	ברונו, הייברד	קיווי בגיל הניבה



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 82/הגה"צ/613
 • אריזות: 5 ל', 20 ל'
 • דרגת רעילות II - רעיל
 • מיוצר ע"י AlzChem Trostberg GmbH
 • משווק ע"י אדמה אגן

דורמקס DORMEX (המשך)

מועד הטיפול	נפח התרסיס (לי/ד')	הריכוז* (%)	הזן	הגידול
אמצע - סוף פברואר ובהתאם לטמפרטורות החורף	150-100 לפי גודל העץ	4-3	זנים שונים	גודגן בגיל ניבה
הערות: מיועד להפגשת הפריחה של זנים שונים ולשיפור ההתעוררות				
סוף פברואר	150-100 לפי גודל העץ	2	סמרסט	אפרסק בגיל הניבה
אמצע עד סוף ינואר	לפי גודל העץ עד הרטבה טובה	3	זני בכורות	תאנים בגיל הניבה
כ-30 יום לפני התעוררות	לפי גודל העץ עד הרטבה טובה	2	תפוח, אגס, אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש, גודגן - בשנתיים הראשונות לאחר נטיעה	
מטרת הטיפול והערות: מיועד לקבלת התעוררות אחידה				
בפריחה מלאה של גל הפריחה הראשונה לפני חנטת הפרי	250-100 לפי גודל העץ	0.4	זנים שונים	מנגו (לפי ניסיון מקומי)
מטרת הטיפול והערות: מיועד להשמדת תפרחות ראשונות				

* לכל הטיפולים בדורמקס (אלזודף) יש להוסיף משטח טריטון X-100 בריכוז 0.025%



ADAMA
PK

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 82/הגה"צ/613
• אריזות: 5, 7, 20 ל'
• דרגת רעילות II - רעיל
• מיוצר ע"י AlzChem Trostberg GmbH
• משווק ע"י אדמה אגן