

# MOSPILAN FOR SPRAYING מוספילן לריסוס

## תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים בגידולים שונים

מכיל: Acetamiprid 200 g/L

### כללי:

מוספילן הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל, מיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע. לתכשיר רעילות נמוכה יחסית לבעלי דם חם.

### רעילות לדבורים ולדבורי בומבוס:

אסור לרסס ישירות על הדבורים והכוורות. מומלץ לסגור את הכוורות לקראת ערב ולרסס כאשר הדבורים לא פעילים בשטח. 24 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורים. 30 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורי בומבוס.

**טבלת השימוש:** דרכים למניעת פיתוח תנגודת - כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר.

מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים	הערות	נפח תריס (לי/ד')	המינון (סמ"ק/ד') או %	המזיק	הגידול
30	הריסוס יינתן עם הופעת זחלים ראשונים בעלים.	5-3 ----- 20-7	40 ריסוס אווירי ----- 25 ריסוס קרקע	כנימת עש הטבק	כותנה
7		50-30 לפי גודל הצמחים	20	כנימה עלה הדלועיים	אבטיח, מלפפון דלורית, דלעת
7		50-30 לפי גודל הצמחים	30	כנימת עש הטבק	עגבנייה, פלפל, חציל, אבטיח, מלון, מלפפון, קישוא

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים	הערות	נפח תרסיס (לי/ד')	המינון (סמ"ק/ד') או %	המזיק	הגידול
10		50-30 לפי גודל הצמחים	15	חיפושית פרעושית	כרוב, ברוקולי
120	הריסוס יינתן עם הופעת זחלי העש הראשונים של המזיק בעלים.	הרטבה מלאה	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	עש המנהרות של ההדר	הדרים**
			0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת הספיראה, כנימת עלה הדלועיים	
	הריסוס יינתן לאחר החנטה בראשית הקיץ		0.075% (75 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימה קמחית כדורית	
	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות באביב - קיץ מוקדם	300-400 במפוח	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימה אדומה	
	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות		0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת השעווה הפלורידית	
25	בכנימת השעווה הפלורידית הריסוס יינתן עם הופעת הזחלנים	120-250 לפי גודל הגפנים	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת השעווה הפלורידית, תריפס סורי, ציקדות	אפרסמון



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1835 / הגה"צ / 2005  
 • סיווג IRAC: 4A • דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות  
 • אריזות: 71, 70.5 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

# מוספילן לריסוס

## MOSPILAN FOR SPRAYING

### המשך

מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים	הערות	נפח תריס (לי/ד')	המינון (סמ"ק/ד') או %	המזיק	הגידול	
45	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	200 - 150 לפי גודל העצים	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת עלה התפוח	תפוח	
			0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)			עש תפוח, ציקדה ורדנית, שלפוחיות עלה האגס (לאוקופטרה), ליטוקוליטיס, פרלטוריה, סס הנמר עש תפוח
			0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)			
45					אגס	
15		150-100 לפי גודל העצים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימת עלה הדלועיים, ציקדות	רימון, שקד	
15	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	200 - 150 לפי גודל העצים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	אנרסיה	שקד	
30	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	200 - 150 לפי גודל העצים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	חיפושית הקליפה, אנרסיה	משמש, שזיף	
30	אם קיימת נוכחות אקריות במטע, הריסוס במוספילן עלול במקרים מסוימים לעודד אותם.	200 - 150 לפי גודל העצים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	אנרסיה	אפרסק/ נקטרינה	
		150-100 לפי גודל העצים	0.04% (40 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	ציקדות		

מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים	הערות	נפח תרסיס (לי/ד')	המינון (סמ"ק/ד') או %	המזיק	הגידול
45		150 - 100 לפי גודל הגפנים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	ציקדות	גפן
20	ריסוס אחד לעונה	200 - 100 לפי גודל העצים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	זבוב הזית	זית
-	הטיפול יינתן אחת ל-6 חודשים לכותרת הדקל ב-3 נקודות, במרחק שווה ביניהן, קרוב ככל האפשר ללולבים. השתמש במרסס ללא דיזה. הקפד שלא יהיה נגר של התרסיס על הגזע.	15 לי/עץ	0.2% (200 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus)	דקל קנרי
-		60-30 ----- 100 ומעלה (הרטבה מלאה)	30 ----- 0.03% (30 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	כנימות עלה כולל כנימת עלה האפרסק, כנימת עש הטבק	אסתר * גפנית * היפיריקום * ורד * ליזיאנטוס * סולידגו * פיטוספורום * רוסקוס
14	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	50-30 לפי גודל הצמחים	30	כנימה עלה הדלועיים, כנימה עש הטבק	בזיליקום (ריחן), מנטה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, מירון



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1835 / הגה"צ / 2005  
 • סיווג IRAC: 4A  
 • דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות  
 • אריזות: 71, 70.5  
 • מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

# מוספילן לריסוס

## MOSPILAN FOR SPRAYING

### המשך

מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים	הערות	נפח תריס (לי/ד')	המינון (סמ"ק/ד') או %	המזיק	הגידול
7	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	50-30 לפי גודל הצמחים	30	כנימה עלה הדלועיים, כנימה עש הטבק	כוסברה, שמיה, פטרוזיליה, סלרי, בצל ירוק, רוקולה, עשב לימון

- \* מוספילן ת.נ. נבדק באסתר בזן "קזבלנקה", בגיפסנית בזן "מיליון סטאר", בהיפריקום בזן "פינק פלייר", בורד בזנים "יופיטר" ו"סוויט אקיטו", בליזיאנטוס בן "קאלו לבן", בסולידגו בזן "טרה", בפיטוספורום בזן "מגוון".
- בכל הגידולים בדוק בטיחות השימוש בזנים שאינם מצוינים כאן על מספר מצומם של צמחים לפני הריסוס המסחרי.
- \*\* מוספילן פוגע בחיפושית הרודוליה שטרופת את כנימת האיצריה ועלול להביא להתפרצות מזיק זה.

## **שילובים:**

פירוט השילובים הבטוחים עם מוספילן בגידולים השונים:

**אבטיח:** סיגנום, סטרובי, שמן וירול

**קישוא:** סיגנום, שמן וירול.

**מלפפון:** ספיידר

**מלון:** סיגנום, סטרובי, שמן וירול

**פלפל:** סיגנום

**חציל:** סיגנום

**עגבניות:** ספיידר, סיגנום

**הדרים:** חנקת אשלגן, גופרת מנגן, תחמוצת אבץ, אוריאה דלת ביורט. (בריוזים המומלצים ע"י ש.ה.מ.).

**גפן:** סיגנום

**כותנה:** סיגנום, טיטאן, אטברון, פיקס

לפני ריסוס בכל שילוב בדוק לבטיחות על מספר מצומצם של צמחים.



**ADAMA**  
אגן

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2005 / הגה"צ / 1835

• דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות

• סיווג IRAC: 4A

• מיוצר ומשווק ע"י אדמה אגן

• אריזות: 71, 70.5 ל'