

משטח SPREADER L-77

תרכיז נוזלי
משטח סיליקון אורגני להגברת פעילות של תכשירי ברזל וג'ברלין

מכיל: Polyalkyleneoxide Modified Heptamethyltrisiloxan

כללי:

משטח L-77 מוריד בצורה משמעותית את מתח הפנים של טיפות התרסיס ומסייע בכך להדבקה ולחדירה יעילה של תכשירי ברזל וג'ברלין לרקמות העלים.
L-77 בשילוב עם תכשירי ברזל מסייע לתיקון כלורוזה בגידולים שונים. L-77 בשילוב עם ג'ברלין גורם להארכת עונת הקטיפ בהדרים.

הוראות שימוש:

1. שילוב גפרת ברזל CP עם משטח L-77 שימוש בגופרת ברזל L-77+CP מיועד רק לעצים הסובלים מכלורוזה. חשוב שהריסוס יבוצע בשעות המוקדמות של הבוקר, עד לשעה 08.00 או לפנות ערב. בהדרים (למעט לימון) - בעצים צעירים לפני גיל ניבה בלבד. בשאר הגידולים בעצים מכל הגילים כמפורט בטבלה.
נפח התרסיס: בהדרים כולל לימון 100-200 ל"ד', בשאר הגידולים 80-150 ל"ד' לפי גודל העצים.

הערות	מס' הטיפול ומועדם בעצים נושאי פרו*	המינון (%)		הגידול
		משטח L-77	גפרת ברזל CP	
מטפלים מדי 30-45 יום	החל מפריצת הצימוח באביב	0.025	0.3	מנגו
לא יותר מ-4 ריסוסים בשנה	באביב עם הופעת הצימוח הצעיר (אין לרסס בזמן פריחה, חנטה ושלבי התפתחות ראשונים של הפרי). טיפולים נוספים מיולי ואילך.	0.1	0.2	אבוקדו

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

הערות	מס' הטיפולים ומועדם בעצים נושאי פרי*	המינון (%)		הגידול
		משטח L-77	גפרת ברזל CP	
	לאחר פריצת הצימוח, לפני החנטה, ריסוס אחד או שניים. ריסוסים נוספים לפי הצורך, מהתחלת אוגוסט ואילך.	0.1	0.2	אפרסמון
	ריסוס ראשון כאשר הצימוח יגיע לאורך של 10 ס"מ ומעלה. ריסוסים נוספים במשך העונה מדי 20-30 יום בהתאם לצורך. לגבי זנים אפילים ראה הערה**.	0.025	0.25	אפרסק (חוץ מנקטרינה)
	1-2 ריסוסים. טיפול ראשון כשבועיים לאחר החנטה, טיפול שני במידת הצורך כעבור כ-30 יום.	0.025	0.25	שזיף אירופי ויפני
	ריסוס אחד או שניים לאחר החנטה.	0.1	0.2	אגס
רצוי לטפל רק בכרמים הסובלים באופן קבוע מכלורוזה.	2 ריסוסים רצופים: ריסוס ראשון לאחר החנטה, ריסוס שני כעבור 30 יום.		0.3	גפן
בפיג'ואה הפרזה בנפח התרסיס עלולה לגרום האדמה זמנית של העלים.	לאחר פריצת הצימוח האביבי ועד לפריחה ולפי הצורך שוב לאחר החנטה.	0.05-0.025	0.2 0.3	פיג'ואה, גואיבה
רק בעצים צעירים שאינם נושאים פרי.		0.1	0.3	הדרים למעט לימון
	ריסוסים מדי 3-4 שבועות בהתאם לצורך.	0.1	0.3	לימון



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 81/הגה"צ/439
 • אריזות: 1 ל'
 • דרגת רעילות III - מסוכן לבריאות
 • מייצר ע"י MOMENTIVE
 • משווק ע"י אדמה אגן

משטח SPREADER L-77 (המשך)

הערות לטבלה ראשונה:

*בעצים צעירים אין מגבלה למועד הריסוס, מרססים מדי 3-4 שבועות לפי הצורך.
** בזנים אפילים רצוי להימנע מריסוס קרוב להבשלת הפרי כי גפרת הברזל יכולה לגרום לכתמים כהים על שערות הפרי. בזנים אפילים מוצע לא יותר מריסוס אחד במשך הקיץ מחשש לנשירת עלים.

2. שילוב ג'ברלין עם משטח L-77 להארכת הקטיף בהדרים.

הערות	המינון (%)		הגידול
ככל שריכוזי הג'ברלין והמשטח יהיו גבוהים יותר, תהיה ההשפעה חזקה יותר.	ריכוז משטח L-77 (%)	תכשיר ג'ברלין ריכוז חומר פעיל בח"מ (PPM)	הדרים
	0.05-0.025	2-5 ח"מ	