

קומודור COMODOR SC

תרכיז רחיף.

קוטל פטריות סיסטמי - להדברת מגוון מחלות בירקות, גידולי שדה ומטע.

מכיל: Azoxystrobin 80 g/L + Chlorothalonil 400 g/L

כללי:

קומודור הינו קוטל פטריות המכיל כלורתלוניל שהינו מרכיב בעל פעילות מניעה רבת אתרים, עובדה האחראית להעדר עמידות למרכיב זה, ומרכיב טרנסלמינרי, אזוקסיסטרובין, בעל פעילות קורטיבית מקבוצת הסטרובילינים. לשני המרכיבים בתכשיר טווח פעילות רחב ביותר נגד מגוון מחלות, שילובם מבטיח פעילות משופרת של מניעה והדברה ומפחית את הסכנה לפיתוח עמידות.

מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל'ד' (ימים)	המינון (סמ"ק/ד') בנפח של 20-75 ל'ד'	המחלה	הגידול
90	0.15% (1)	-	כתמי עלים	אפרסמון
15	-	150-200 (2)	חלפת, כימשון	תפוח אדמה
60	יישום בפס הזריעה (6)	250 סמ"ק ל-1000 מטר שורה	ריזוקטוניה (מק-שורש)	
15	-	100-200 (3)	חלפת הגזר, קימחון הגזר	גזר
15	-	200	סטמפיליום, חילדון	שום
15	-	200	סטמפיליום, כשותית	בצל

מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל' / ד'	המינון (סמ"ק/ד') בנפח של 20-75 ל' / ד'	המחלה	הגידול
16	-	150	כתמי אסכוכיטה	חימצה, אפונה
14	-	150	כתמת (צרקוספורה)	סלרי
15	-	100	קימחון הדלועיים	אבטיח
3	-	200	כשותית הדלועיים	מלפפון, מלון
	-	100	קימחון הדלועיים	
3	-	בהגמעה 400(4)	התמוטטות פתאומית (מונוספוראסקוס)	מלון
3	0.15%	150	קמחונית, קימחון העגבנייה, כימשון	עגבנייה
30	-	150	כתמת (צרקוספורה)	אגוזי אדמה
90	0.15% (5)	-	עין הטווס	זית
14	0.15% (7)	-	רקבון חיצוני (אלטרנריה אלטרנטה)	תפוח
3	-	200	חלפת מצליבים	ברוקולי



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 2007 / הגה"צ/1918

- סיווג FRAC: 3C+M
- דרגת רעילות IV - מסוכן
- אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר
- מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
- משווק ע"י אדמה אגן

קומודור (המשך) COMODOR SC

הערות לטבלה:

- (1) יש לרסס במהלך החנטה לפחות שני ריסוסים באינטרוול של שבועיים.
- (2) המינון בהתאם לגודל נוף הצמחים ולעוצמת המחלה.
- (3) המינון הנמוך לטיפול מניעה, מינון גבוה לטיפול תגובה על מחלה קיימת.
- (4) טיפול ראשון 10-20 יום משתילה, טיפול עוקב לאחר 2-3 שבועות. טיפול קומודור אינו תחליף לחיטוי קרקע. אין ליישם במצע מנותק או בעת שהגידול בעקה. יש להזריק את התכשיר מהול למערכת טפטוף מנותקת אוויר. יש ליישם במשאבת דישון במהלך השקיית 2-4 קוב/דונם ובסוף היישום להזרים קוב מים נוסף לשטיפת המערכת.
- (5) ריסוס ראשון באוקטובר, ריסוס שני בדצמבר. ריסוסים נוספים במידת הצורך בינואר ובמרץ.
- (6) יש ליישם במהלך הזריעה באמצעות 4 (או 2) פומיות המורכבות על גבי המזרעה כאשר 2 (או 1) מכוונות לחריץ הזריעה לפני נפילת הפקעות ו-2 (או 1) מכוונות לריסוס על גבי הפקעות לפני כסוי ובניית הגדודית מחדש. נבדק ונמצא בטוח בדנים: וולור, אלפא, רוזנה, רודאו, קוליברי, דיפלה, וולדי, סנטה.
- (7) לשימוש בזן פינק ליידי בלבד. להדברה מושלמת של המחלה יש ליישם תכשירים מתאימים מקבוצות כימיות שונות כל 14 ימים החל מאמצע חודש אוגוסט. התכשיר מוגבל ליישום אחד בעונה.

שילובים:

ניתן לשלב קומודור עם התכשירים הבאים, בהתאם למינונים וההנחיות המופיעות בתוויות האריזה שלהם:

תפוז"א - טלסטאר.

גזר - אטברון.

חימצה - קנון, 50 טלסטאר, פנטרה, דואל גולד.

אבטיח - וורטימק.

מלון - דומארק (בריסוס בלבד)

מלפפון - סוויץ'!

אגוזי אדמה - טלסטאר.



ADAMA
אגן

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1918/צה"ג / 2007
• סיווג FRAC: 3C+M • דרגת רעילות IV - מסוכן
• אריזות: 1 ליטר, 5 ליטר • מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
• משווק ע"י אדמה אגן •