

רידומיל גולד MZ RIDOMIL GOLD MZ

גרגרים רחיפים.
קוטל פטריות להדברת מחלות צמחים.

מכיל: Metalaxyl-M 4% +Mancozeb 64%

כללי:

רידומיל גולד MZ מכיל את האיזומר הפעיל של מטלקסיל (ששמו, Metalaxyl-M מקבוצה 4 PhenylAmides). כמו-כן התכשיר מכיל מנקוזב מקבוצה M3 הפעיל כנגד מספר אתרים במחלה. רידומיל גולד MZ יעיל להדברת מחלות הכשותית והכמשון ולמניעת מחלת הכתמים השקועים ("כתמי בית שאן") בגזה יש לזכור כי עלולים להתפתח גזעים עמידים למטלקסיל, M- אשר יגרמו לפחיתה ביעילות התכשיר. לפיכך אין להשתמש בו ברציפות ויש להחליף עם קוטלי פטריות מקבוצות אחרות.

הגידול	המחלה	המינון (גרם/ד') בנפח קטן עד 60 ל"ד'	הריכוז (%) בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד'	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הערות
גזר	כתמים שקועים ("כתמי בית שאן")	1600	-	21	מועד הריסוס: 35-40 יום לאחר הצאת הגזר. (כאשר האשרוש בעובי עפרון, עם תחילת הופעת צבע כתום). מיד לאחר הריסוס המטר 30-40 מ"ק לדונם.
תפוח-אדמה	כמשון	300	-	7	אין לתת יותר מ-2-3 ריסוסים לעונה. רצוי לתת אותם בתחילת הופעת המחלה.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשירים.

הגידול	המחלה	המינון (גרם/ד"י) בנפח קטן עד 60 ל"ד'	הריכוז בריסוס נגירה או בנפח מעל 100 ל"ד'	מועד אחרון לריסוס לפני אסיף (ימים)	הערות
עגבנייה	כמשון	300	0.3%	למאכל- 5 לתעשייה- 14	אין לתת יותר מ-2-3 ריסוסים לעונה. רצוי לתת אותם בתחילת הופעת המחלה.
מלפפון, מלון, קישוא	כשותית	300	0.3%	3	אין לרסס מעל 2-3 טיפולים בעונה.
בצל	כשותית	300	-	7	
כרוביים	כשותית	300	-	14	
כרוב סיני	חילדון לבן	300	-	14	
צנונית	כשותית	300	-	25	
חמצה, אפונה	כשותית	300	-	14	רסס עם גילוי הכתמים הראשונים של הכשותית.
חסה	כשותית	300	-	14	
פטרזיליה	כשותית	300	-	14	



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1698/הגה"צ/2002

- דרגת רעילות IV - מסוכן
- סיווג A1+M3:FRAC
- אריזות: 1 ק"ג, 5 ק"ג
- מיוצר ע"י Syngenta Crop Protection Ag
- משווק ע"י אדמה אגן