

# בז BAZ

## תרכיז מתחלב ותריפס

קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה חדש, פעיל על זחלים של עשי לילה ותריפס פועל כרעל קיבה ומגע, אינו סיסטמי ואינו קוטל ביצים.

מכיל: Pyridalyl 500 g/L

## הוראות השימוש:

כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר יש לרסס חליפות בתכשיר זה ובתכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. אין לרסס יותר משני ריסוסים בעונה. גשם היוורד שעה לאחר הריסוס לא יפגע ביעילות הטיפול. אין לרסס צמחים בעקה. אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין, קרה וכדומה). התכשיר לא רעיל לדבורים ולדבורי בומבוס.

ימי המתנה לפני קטיף	נפח תריפס (ל"ד')	המינון (סמ"ק/ד' או %)	התות שדה	הגידול
5	50-20	20	עשית המצליבים (עש הכרוב), עש לב הכרוב, פרודניה	כרוב, כרובית, ברוקולי
10		20	פרודניה	חסה
10		20		פטרודזיליה, שמיה, כוסברה
21				גזר
7		20	פרודניה, תנשמית האביב (הליותיס)	אגוזי אדמה
7		20	פרודניה, תנשמית האביב (הליותיס), פלוזיה	תפוחי אדמה
14				בטטה
5		20	תנשמית האביב (הליותיס)	תירס, תירס מתוק
21		20	תנשמית האביב (הליותיס)	חימצה
5		50-20	20	פרודניה
5	כיסוי מלא של העלווה	50	תריפס הטבק	מלפפון**
15	30-10	20	תנשמית האביב (הליותיס)	כותנה
-	50-30	20	פרודניה, לפיגמה	גיפסנית, גרברה, אסקליפיוס, ורד*

\* בוורד נבדק בזנים: Lovely Red, Enigma, Kashmir בגרברה נבדק בזנים: פיקובלו, דיונה. בגיפסנית נבדק הזן: מיליון סטאה. \*\* בעת הופעת המזיק ינתנו 2 ריסוסים בהפרש של 7-10 ימים. לאחר מכן ינתנו טיפולים עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר. למניעת תנגודת, אין לרסס יותר מפעמים בגידול בעונה. במלפפון נבדק שילוב עם נימגארד 1%. \*\*\*לשיפור היעילות ניתן לשלב עם 1% נימגארד



מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1857/ הגה"צ / 2007  
 • סיווג IRAC: חדש  
 • מיוצר ע"י Sumitomo  
 • דרגת רעילות IV - מסוכן  
 • משווק ע"י אדמה אגן  
 • אריזות: 0.5 ליטר

ימי המתנה לפני קטיף	נפח תריפס (ל"ד')	המינון (סמ"ק/ד' או %)	המזיק	הגידול
3	50-20	20	פרודניה, לפיגמה, תנשמית האביב (הליותיס)	עגבנייה
			פלוזיה	
			טוטה אבסולוטה**	
12	70-30 (כיסוי מלא של העלווה)	***100	תריפס פרחים קליפורני	פלפל
3	50-20	20	פרודניה, לפיגמה	פלפל
13				פפריקה