

# טקטור® | Tecto | تاکتو

תרכיז רחיק S.C

קוטל פטריות להדברת מחלות בגזר לאחר אסיף, באגס ובהדרים לאחר קטיף



דרגת רעילות: IV - מסוכן

מס' או"ם: 3082

מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: Thiabendazole 500 g/l

רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1695/ה"צ/02

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

## אופן היישום:

הגידול	מחלה	אופן הטיפול	המינון	הערות
אגס	עובש כחול (פניציליום) עובש אפור (בוטריטיס)	טיפול אחר קטיף בטבילה	0.24%	יש להחליף את תמיסת הטבילה מדי 100 טון פרי או כאשר התמיסה הופכת עכורה או מלוכלכת
גזר	קשיוניה גדולה	טיפול אחר אסיף בטבילה	0.1%	יש לבחוש בין טבילה לטבילה. אין להשתמש בתמיסה יותר מיום אחד
הדרים	עובש כחול עובש ירוק	טיפול אחר קטיף: 1. במקלח (למשך 30-60 שניות)	0.1%	יש לדלל את התרחיף במיכל היוסות הפועל ולהוסיף למקלח כאשר הוא פועל. השלמת הנפח תיעשה ממכל היוסות שריכוזו יהיה 0.25%
	רקבונות עוקץ	2. בערפול	1%	ערפול מעל למברשות כאשר הפרי מושם מעליהן, לפני יבוש ודינוג הפרי