

**אופן היישום:**

ימי המתנה לפני קטיף (ימים)	נפח תרסיס (ל"/ד") <sup>(5)</sup>	ריכוז/מינון (% או סמ"ק/ד")	הפגע	הגידול
(2) 11	10-60	100	תריפס הטבק, תריפס קליפורני	חסה <sup>(5)</sup> במבנים סגורים
(2) 7				כרפס (סלרי), פטרוזיליה
(2) 5				בצל ירוק
(2) 14	80-200	0.1%	ציקדות	אפרסק, נקטרינה, שזיף
(3) 3				שקד
(2) 14				גפן
(4) 14				אגס
(2) 3	40-120	100 בשילוב 1% נימגארד בנפח תרסיס מעל 100 ל"/ד - ריכוז 0.1% בשילוב 1% נימגארד	תריפס הטבק	מלפפון <sup>(5)</sup>
(2) 7				פלפל <sup>(5)</sup> , חציל
(3) 7	30-80	100	עשית המצליבים (עש הכרוב)	כרוב
(2) 5				כרובית
(3) 6				בצל <sup>(5)</sup>
(3) 14	80-300	0.1%	כנימת המנוגו (דרגות צעירות ובוגרות)	מנוגו

**הערות לטבלת היישום:**

- נפח תרסיס יקבע בהתאם לגודל הצמח, יש להקפיד שהריסוס יגיע לכל חלקי הצמח.
  - מוגבל ליישום בודד לעונה.
  - מוגבל ל- 2 יישומים בהפרש של שבוע לפחות.
  - מוגבל ל- 2 יישומים בהפרש של שבועיים.
  - אין לטפל בגיעות גבוהה:**  
**מלפפון** - עד 5 תריפסים לעלה.  
**בצל וחסה** - עד חמישה תריפסים לצמח.  
**פלפל** - עד 2 תריפסים לפרח. יש להקפיד על ריסוס מיטבי, בפלפל עד להגעת התרסיס לפרחים.
- שילובים:** בכל שילוב יש לפעול בכפוף להוראות תווית התכשיר המשולב
- חסה** - ניתן לשלב אומי עם נימגארד 1
- פלפל** - עד 2 תריפסים לפרח. יש להקפיד על ריסוס מיטבי, בפלפל עד להגעת התרסיס לפרחים.

**תרכיז מתחלב E.C**



**אומי**<sup>®</sup>  
Omi | اومي

**מכיל:** Tolfenpyrad 15%

**רשיון השירותים להגנת הצומח מס':** 1781/ה"צ/2018  
**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**דרגת רעילות:** II - רעיל

**מס' או"ם:** 2902

**מיוצר ע"י:** Nihon Nohyaku, יפן

**כללי:**

קוטל חרקים חדשני, המדביר מגוון מזיקים, פועל כרעל קיבה ומגע. מנגנון הפעולה הינו עיכוב מעבר אלקטרונים במיטוכונדריה. במידה ולא צויין אחרת, מותר להשתמש בתכשיר עד פעמיים בעונת גידול ולא ברצף! בין היישומים, יש לוודא שמטפלים בתכשיר אחר, שאינו מכיל את אותו החומר הפעיל. זאת על מנת למנוע מקרים של שאריות חריגות בקטיף. חל איסור לרסס אחרי, בזמן ולפני צפי למזג אוויר חריג (שרב, קרה וכו') ו/או על גידולים השרויים בעקה. בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע.