

גרגרים רחיפים W.G
קוטל פטריות להדברת קימחונית
בפלפל ובחציל, קימחונית ואקרית חלודה
בעגבניה, קימחון בתות שדה, בדלועיים,
בנקטרינה ובגפן וכן אקרית חלודה בהדרים



תיוביט®

ThiovitJet | תיוביט

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: לא מסווג
מיוצר ע"י: **syngenta**

מכיל: Sulfur 80%
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4634/צ/22
מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית רישיון מס': 7569
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

תיוביט קוטל את הפגע הרגיש לו הן במגע והן באמצעות פאזה גזית.
תיוביט משווק בתוארית של גרגרים רחיפים המתרחפים בקלות ובמהירות במי התרסיס.
חלקיקי הגופרית הזעירים בתוארית הגרגרית מאפשרים פיזור אופטימלי על העלווה והפירות
באמצעי הריסוס המקובלים. תיוביט מתאים לריסוס במתכונת של הדברה משולבת (IPM)
בהתאם להמלצות ולמגבלות המפורטות בדפי המידע.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

הגידול	הנגע	ריכוז או מינון*	נפח התרסיס**	טיפול אחרון לפני קטיף (ימים)	הערות
עגבניה למאכל בהדליה בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: 819, 870, 906, 1402, נסיכה, שרי, 1335	קימחונית, אקרית החלודה של העגבניה	1.0%-0.5%	50-100 ל'ד'	3	מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים.
		300 גר'ד'	30-40 ל'ד'		
	קימחונית	1.0%-0.5%	50-100 ל'ד'	עגבניה למאכל ולתעשייה בגידול משתרע בשטח הגלוי והחסוי מהזנים: 4303, 9176, AB-8, 9665, 9557, 3155, 9382, 3060	
פלפל מהזנים: אוהד, קליבר, קריזמה, מנטה, 4408, מאור	קימחונית	1.0%-0.5%	50-100 ל'ד'	3	מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים.
חציל מהזנים: 1726 (קלסיק)	קימחונית	1% (-800 גר'ד')	40-80 ל'ד' בהתאם לגודל הגוף. במרסס רובים או במרסס מפוח	3	מרססים עם הופעת הנגיעות וממשיכים לרסס מדי שבוע בתוכנית של ריסוסים חלופיים.
תות שדה מהזנים: 328 (תמר), 329 (יעל), חרות, 543	קימחון	200-300 גר'ד'	50-30 ל'ד'	3	הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.
אבטיח מהזנים: 313, 5244, 1262, 8003, 616, 740 קרימזון	קימחון	200-100 גר'ד'	50-30 ל'ד'	3	
		300-200 גר'ד'			
		300-200 גר'ד'			
מלון מהזנים: 6004, אופיק, 6407, דלנו, 6402, מגנטה	קימחון	300-200 גר'ד'	50-30 ל'ד'	3	הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.
קישוא מהזנים: ארליקה, 413, צוק	קימחון	0.5%	100-200 ל'ד' (עד נגירה)	3	הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.
גפן יין מהזנים: קריניאן, סוביניון-בלאנק	קימחון	0.5%	100-200 ל'ד' (עד נגירה)	3	הקפד לא לרסס בימים חמים או כשצפויים תנאי שרב.
נקטרינה מהזנים: רד רובי, RC-338, W-835, סנו קווין, 192, 515, 320ee, קווין גאינט	קימחון	0.5%	100-200 ל'ד' במרסס מפוח בטיפות קטנות	3	אין לרסס בזמן פריחה. אין לרסס בטמ' מעל 28°C. אין לרסס עד נגירה.
הדרים מהזנים: אשכולית לבנה, פומלו (גולית), פומלית, טבורי (ניו הול, ליין לייט, וושינגטון), ולנסיה, שמוטי, לימון, סצומה, ראשון, נובה, מינואלה, וינולה, מיכל, אורה, אור 1, מוה, מירב, מורקוט, טובז	אקרית החלודה של ההדר	0.5%-0.75%	100-400	3	מועד ההדברה כמפורט בתוכנית ההדברה של אקרית החלודה בהדרים. אין לשלב בשמן - ראה הערה "שימוש בשמנים".

תיוביט®

*מרססים בריכוז הנמוך ברמת נגיעות נמוכה ובריכוז הגבוה בנגיעות גבוהה.
**יש לרסס בנפח תרסיס שיבטיח כיסוי נאות של העלווה והפירות, בהתאם לגובה הנוף, שיטת הריסוס, ומיקום הפגע.

שילובים:

בהיעדר מידע אין לשלב עם תכשירים אחרים.

שימוש בשמנים:

בירקות - יש להמתין לפחות 14 יום בין ריסוס שמן לבין תיוביט ולהיפך.
בהדרים - יש להמתין 21 ימים לפחות בין שימוש בתיוביט לשמן ולהיפך.