

תרכיז נוזלי S.L
להדברת עשבים ולייבוש נוף



רגלון®
Reglone | رجلون

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 1760
מיוצר ע"י: syngenta

מכילי: Diquat 200 g/l
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 664/הצ/82
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

תכשיר מקבוצת הביפירידילים. פועל על הרקמות הירוקות של הצמחים וגורם לתמותתם. החומר נספח לקרקע ומאבד את פעולתו ולכן אין חשש לשאריות בקרקע. פעילותו מהירה בתנאי אור וחום ואיטית יותר בתנאי קור ועננות. יעילות הטיפול איננה נפגמת ע"י השקייה או גשם כעבור כ-3 שעות מהריסוס. רגלון יעיל במיוחד כקוטל עשבים רחבי עלים. רגלון מייבש נוף תפוחי אדמה וגידולים שונים כהכנה לאסיף. בריסוס להקמלת צמחי מספוא לתחמיץ ומרעה טבעי, שומר הרגלון על הערך המזין של הצמחים המרוססים מבלי לפגוע בבריאות בקר וצאן. טיפול ברגלון להקמלה עלול להוריד את תכולת הקרוטן בחומר המוקמל. ריסוס בשעות אחר הצהרים המאוחרות והערב ישפר את יעילות ההדברה של התכשיר.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

אופן היישום:

הגידול	העשבים המודברים	מינון סמ"ק/ד'	הערות
גידול שדה וגן הכנה לזריעה	רחבי עלים	450-150	הריסוס יינתן לפני הצצת הגידול. בקרקעות חוליות מאוד אין לרסס במשך 3 ימים לפני הצצת הגידול.
	עשביה מעורבת	50	לעשביה מעורבת עד 10 ס"מ גובה.
	דגנים ורחבי עלים	150	לעשביה מעורבת עד 30 ס"מ גובה.
ריסוס מכוון או מוגן בין שורות גידול קיים	רחבי עלים	250-150	המינון בהתאם לגובה העשבייה.
	עשביה מעורבת	50	לעשביה מעורבת עד 10 ס"מ גובה.
	דגנים ורחבי עלים	150	לעשביה מעורבת עד 30 ס"מ גובה.
מטעים	רחבי עלים	500-250	המינון בהתאם לגובה העשבייה. הימנע מפגיעה בחלקים ירוקים של העץ.
אספסת	כשות	200	הריסוס יינתן תמיד לאחר הקציר ולפני התחלת הבלוב החדש. יש לחזור על הטיפול 2-3 פעמים. אין לרסס אספסת בשנת הגידול הראשונה.
שטחי בור	רחבי עלים	500-250	המינון בהתאם לגובה העשבייה.
תפוחי אדמה לייבוש הנוף		500-300 ללא תוספת משטח	המינון בהתאם לצפיפות הנוף ומהירות הייבוש הרצויה. אין לרסס תפוחי אדמה הסובלים מייבוש.
חמניות לייבוש קוודקודים		300	הריסוס יינתן עם גמר מילוי הזרעים כחודש לפני האסיף ולפחות 3 שבועות לפני האסיף.
אספסת הקמלה להאבסה		300-200	הריסוס יבוצע 3-4 ימים לפני הקציר. מותר להאביס החל מ-21 יום לאחר קציר. אין לרסס באספסת שנה ראשונה.
מרעה טבעי הקמלה		300-200	הריסוס יינתן בתחילת הפריחה של הצמח השולט במרעה. אין להעלות מקנה אלא כעבור 21 יום ממועד הריסוס האחרון.