

גרגרים מסיסים WSG

ברלקס® 40%
Berelex 40% | برلكس

דרגת רעילות: IV - מסוכן
מס' או"ם: בלתי מסווג
מיוצר ע"י: Valent, BioSicences

מכיל: Gibberellic acid 40% 1 גרם ח"פ בשקיק
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 1915/ה"צ/07
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

לזוויסות צמיחה, הגברת חנטה והשפעה על יכול בגפן, אפרסימון, אגס וקינרס.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

אופן היישום:

הוראות מיוחדות	נפח לדונם	מינון ל- 100 ליטר מים		אופן וזמן הטיפול	המטרה	הזן
		מספר שקיות	גרם תכשיר			
תוספת 20 סמ"ק משטח טריטון 100X ל- 100 ליטר מים	הרטבה מלאה	2	5	טבילה בהגיע הגרגר לגודל 10 מ"מ	הגדלת גרגר	גפן סופריוור
	הרטבה מלאה	1.5	3.75	טבילה בהגיע הגרגר לגודל 6-8 מ"מ	הגדלת גרגר	גפן רד-גלוב
	הרטבה מלאה	1.5	3.75	2 ריסוסים: ראשון ב- 80% פריחה, שני ב- 30% פריחה	דלול	גפן תומפסון
	הרטבה מלאה	3-4	7.5-10	3-4 ריסוסים בהפרש של 4-5 ימים החל מגרגר בגודל 4-6 מ"מ	הגדלת גרגר	
	הרטבה מלאה	0.75	1.9	ריסוס אחד ב- 80% פריחה	דלול	גפן פלם סידלט
	הרטבה מלאה	3	7.5	2 ריסוסים בהפרש של 5 ימים החל מגרגר בגודל 4-6 מ"מ	הגדלת גרגר	
בתוספת משטח "טריטון 100X" בריכוז 0.025%	עד נגירה	5	12.5	ריסוס בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר	הארכת עונת הקטיף וחיי האיחסון והמדף	אפרסמון (הזן: טריומף)
בתוספת משטח "טריטון 100X" ל- 100 ליטר מים	נפח בינוני	1.5-3	3.75-7.5	ריסוס - רצוי בפריחה מלאה	בעצים בוגרים מעל גיל 4 הגברת החנטה שנפגמה מסיבות שונות	אגס

ברלקס® 40

אופן היישום:

מיוחדות הוראות	נפח לדונם	מינון ל- 100 ליטר מים		אופן זמן הטיפול	המטרה	הזן
		מספר שקיות	גרם תכשיר			
אין לרסס חלקות שאינן מצטינות בהתפתחותן, משובשות בעשבי בר או חולות. חשוב: טיפול זה בא רק בתוספת לטיפולים המומלצים לאותה מטרה.	הרטבה מלאה של נוף הצמח, כמות התרסיס בהתאם להתפתחות הצמח. לרסס אחרי ההשקיה.	3-4	7.5-10	שני ריסוסים - הראשון: ראשית אוקי השני: 21 יום אחרי הראשון	הקדמת יבול	קינרס: (הזן: סגול בכיר)
		12	30	ריסוסים - הראשון: 5-10 בספט', השני: 20 יום אחרי הראשון, השלישי: 20 יום אחרי השני	הקדמת יבול	(הזן: ירוק)

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר