

אופן היישום:

ימי המתנה לפני קטיף (ימים)	נפח תרסיס (ל/ד') ⁽¹⁾	ריכוז/מינון (% או סמ"ק/ד')	הפגע*	הגידול
7	100-200	0.25%	כתמת (צרקוספור) (יעילות בינונית)	דובדבן
	400-100		עין טווס	זית
	40-5	300	ריקבון חום, כתמי חלפת	הדרים
	120-30 בהתאם לגודל הצמח	300 בנפח תרסיס של 100 ל/ד', יש לרסס במינון 0.3%	כימסון	תפוח אדמה
	300-80 בהתאם לגודל העץ	0.25%	השחרה חיידקית	עגבנייה
	200-80 בהתאם לגודל העץ	0.1%	חירכון	מנגו
	130-50	0.25%	כשותית הגבן	אגס ⁽²⁾
	60-30	250	חלפת המצליבים	גפן
	60-180	0.25% שני ריסוסים עוכבים בהפרש של 14 יום ⁽⁴⁾	מללת (בוטריוספרה) הגורמת להפלת חנטים	ברוקולי
				אבוקדו ⁽³⁾

1. נפח תרסיס יקבע בהתאם לגודל הצמח, יש להקפיד שהריסוס יגיע לכל חלקי הצמח.
2. בתנאים מסוימים עלולים להיווצר סימני חספוס על פירות אגס.
3. באבוקדו נוסה רק בזני האס ואטינגר.
4. יישום ראשון 50% פריחה, יישום שני ב- 100% פריחה (בצד המקדים של העץ, בכל אשכול פריחה יש פרחים פתוחים). אין ליישם בריכוז גבוה מ- 0.25%.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

תרכיז רחף S.C
להדברת מחלות במטעים ובירקות



מאסטרקופ®
Mastercop | ماستيركوب

דרגת רעילות: III - מסוכן לבריאות
מס' או"ם: 3082
מיוצר ע"י: Ingenieria Industrial,
מקסיקו (מקב' אדמה)

מכיל: copper sulfate pentahydrate 21.6% w/w
אקוויוולנטי ל-5.5% נחושת מתכתית
רשיון השירותים להגנת הצומח מס': 4371/ה"צ/2017
רשיון השירותים להגנת הצומח חקלאות אורגנית:
7565/ה"צ/2022
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

כללי:

תכשיר המבוסס על נחושת, בתוארית נוזלית להדברת מחלות במטעים, ירקות וכרם.