

USO AGRICOLA



ACRE®

nicosulfuron

HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA BASE ACEITE

HERBICIDA

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
NICOSULFURON: 2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil)sulfamoil]- <i>N,N</i> -dimetilnicotinamida (Equivalente a 40.2 i.a./L a 20°C)	4.1
INGREDIENTES INERTES: Emulsificante, surfactante y portador.	95.9
TOTAL:	100.0

REG. RSCO-HEDE-0274-X0093-423-4.10
CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Número de lote: Fecha de fabricación:
Fecha de caducidad: Dos años después de su fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:
INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
CARRETERA A TECUALTITAN KM. 0.676, SAN MIGUEL
ZAPOTITLAN, PONCITLAN, 45977, JALISCO.
TEL.: + 52 (55) 55 24 83 69.

DISTRIBUIDOR:
INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.
AV. INSURGENTES SUR No. 800 PISO 19,
COL. DEL VALLE,
MÉXICO D.F., MÉXICO, 03100.
E-MAIL: adamamexico@adama.com
PÁGINA WEB: www.adama.com/mexico
Tel.: + 52 (55) 55 24 83 69.
Fax: +52 (55) 55 23 04 15.

HECHO EN RUMANIA

PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar el equipo de protección personal adecuado como camisa de manga larga, pantalones largos, calcetines con zapatos o botas resistentes al agua. Se recomienda utilizar un overol sobre la ropa, que cubra los guantes y botas para evitar infiltración del producto al cuerpo. Los guantes que dan mayor protección en el manejo de productos químicos agrícolas son los de nitrilo, butilo y/o neopreno. Usar goggles o mascarilla protectora durante la aplicación, así como gorra o sombrero de plástico. Durante la preparación y aplicación del producto hágala a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. No destape la boquilla con la boca. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación, quítese el overol y colóquelo en un lugar ventilado, la ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES."

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS"

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS"

"NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN"

"NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO"

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO"

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA"

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL"

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos.

Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado.

Si el producto es ingerido, lave la boca con buches de agua y consiga atención médica inmediata, mostrando la etiqueta. Si el paciente está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no trate de introducir nada a la boca. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUIMICO: El Nicosulfuron pertenece al grupo químico de las Sulfonilureas.

SIGNOS Y SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: La ingestión puede causar irritación, lagrimeo o visión borrosa. El contacto con la piel puede causar irritación o comezón. El contacto por vía inhalatoria puede provocar dificultad para respirar.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico contra la intoxicación, proporcionar tratamiento sintomático y de soporte al paciente.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASE VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS).

GARANTÍA

Ingeniería Industrial, S.A. de C.V., garantiza el contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta, pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.



**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ
RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO
¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!**

ACRE® es un herbicida sistémico, altamente selectivo al maíz, de aplicación post-emergente y controla la maleza abajo indicada en el cultivo de maíz. Es absorbido rápidamente a través del follaje y translocado a los tejidos meristemáticos. Sus efectos se manifiestan al inhibir el crecimiento de las plantas tratadas y sus síntomas de daño se hacen notar entre una y dos semanas después del tratamiento, iniciando con una clorosis gradual en áreas meristemáticas y seguido de una necrosis generalizada. Este producto es recomendado para su uso en el siguiente cultivo:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
MAÍZ (SL)	Zacate pitillo <i>Ixophorus unisetus</i>	1.5 – 2.0	Aplicarse en post-emergencia a la maleza y al cultivo, 30 días después de la siembra, procurando que el suelo mantenga buenas condiciones de humedad. Asegure un cubrimiento uniforme de la maleza. El equipo deberá ser calibrado para dar un gasto de 231 L/Ha.
	Correhuela <i>Ipomoea nil</i>	2.0	

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la recolección o cosecha.

SL: Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: 12 horas.

METODO DE PREPARACIÓN Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección señalado en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Forma de abrir el envase del producto: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Método de preparación: Llene ¾ partes del tanque con agua limpia. Agregue la dosis requerida al tanque, agite la solución con un agitador mecánico (nunca directamente con las manos) durante 5 minutos hasta homogeneizar totalmente. Termine de llenar el depósito con agua manteniendo agitación continua.

Equipo de aplicación: Asegúrese de mantener el equipo bien calibrado. La aplicación se puede realizar con equipo terrestre, motorizado o de mochila con boquilla Tee Jet 11003. Asegúrese de realizar una aplicación uniforme y evite el acarreamiento del producto a otros cultivos susceptibles.

CONTRAINDICACIONES

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, siempre a favor del viento, no aplique este producto cuando haya viento (mayores a 15 km/h). No aplicar a través de cualquier tipo de sistema de irrigación. No aplique donde haya cultivos susceptibles.

FITOTOXICIDAD

ACRE® no es fitotóxico para los cultivos y bajo las recomendaciones que se indican en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda mezclar **ACRE®** con otros productos agroquímicos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

