



GOLTIX[®] SC



ADAMA



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Metamitron 700 g/L (58,3 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12629N (W.6)

Toelatingshouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.



www.agrirecover.eu

NO VARNISH
AREA



NEDERLAND

L10732IPFR_J4

5 L e



GOLTIX[®] SC



ADAMA



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Werkzame stof

- Metamitron 700 g/L (58,3 % w/w)



Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12629N (W.6)

Toelatinghouder:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland

www.adama.com

Batchnr. & prod. datum: zie verpakking.



Scan voor gebruik



Deze verpakking is
bedrijfsafval.



www.agrirecover.eu

UN3082



8

718077 002156



NEDERLAND

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken ● H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden ● P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product ● P280C: Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen

● P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval ● SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

RESISTENTIEGROEP

C1

HERBICIDE



WAARSCHUWING

L1107320CFR_14

4 x 5 L



GOLTIX[®] SC



ADAMA



NEDERLAND



WAARSCHUWING



SPECIMEN



UN3082

LJ0732PAAR_J4

30 x 20
L



GOLTIX[®] SC



ADAMA



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/ver-

RESISTENTIEGROEP C1 HERBICIDE

pakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

L10732IPBB_14



WAARSCHUWING

UN3082

UFI: 9PS1-124Y-800W-7TSE



NERDERLAND



8 718077 002149



EERSTE HULP



GEBRUIK & DOSIS

hier openen





GOLTIX[®] SC



HERBICIDE

Suspensie concentraat



Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDRAAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL
Metamitron

GEVARENAANDUIDINGEN

H302: Schadelijk bij inslikken • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VOORZORGSMAATREGELEN

P102: Buiten het bereik van kinderen houden • **P270:** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product • **P280C:** Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen • **P501:** Inhoud/ver-

RESISTENTIEGROEP C1 HERBICIDE

pakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HERBETREDEN

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

HANTEREN EN OPSLAG

In originele vaten bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van rechtstreeks zonlicht. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

LJ0732IPBB_14



WAARSCHUWING

UN3082

UFI: 9PS1-124Y-800W-7TSE



NEDERLAND



8 718077 002149



EERSTE HULP MAATREGELEN

Inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Een arts raadplegen.

Contact met de huid

Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en water, vervolgens spoelen met warm water.

Contact met de ogen

Het oog gedurende 15 minuten blijven spoelen met zuiver water, door vaak met de oogleden te knippen. Een arts raadplegen.

Inname

De mond spoelen met water. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon. Een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE ARTS

Geen specifiek bekend tegengif. Geef ondersteunende therapie. Symptomatisch behandelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5–3 L/ha ²	1 per teeltcyclus	5 L/ha	-
	rond opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ³	1 per teeltcyclus		14 ⁷
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5–1 L/ha ⁴	6 per teeltcyclus		5 ⁸
Afrikaantjes (<i>Tagetes</i>) als groenbemester	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5–2 L/ha ²	5 per teeltcyclus	5 L/ha	7
Rode biet	voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5–3 L/ha ²	1 per teeltcyclus	5 L/ha	-
	rond opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ³	1 per teeltcyclus		14 ⁷
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5–1 L/ha ⁴	6 per teeltcyclus		5 ⁸
Bloembol- en bloemkoolgewassen m.u.v. lelie (onbedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ²	2 per teeltcyclus	4 L/ha	7
Lelie (onbedekte teelt)	rond opkomst of na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ²	1 per teeltcyclus	5 L/ha	7
	na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5 L/ha ⁵	10 per teeltcyclus		
Lelie (bedekte teelt)	Rond opkomst en na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1–2 L/ha ⁶	2 per 12 maanden	4 L/ha	7

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² Dosering afhankelijk van de grondsoort

³ In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.

⁴ LDS in combinatie met toegelaten middelen

⁵ LDS in combinatie mettoegelaten middelen.

⁶ De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

⁷ Het minimum interval tussen de rond opkomst behandeling en de voorgaande voor opkomst behandeling is 14 dagen.

⁸ Het minimum interval tussen de eerste na opkomst behandeling en de voorgaande rond opkomst behandeling en tussen na opkomst behandelingen onderling is 5 dagen.

Toepassingsvoorwaarden

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is Goltix® SC toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:
-zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
-na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metamitron. Metamitron behoort tot de triazonen. De Hrac code is C1. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

AANBEVELINGEN

Voorkomen emissie

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert ADAMA om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangvoorziening voor verontreinigde vloeistoffen. Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een biologisch zuiveringsstelsel om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater en hoe deze te beperken.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.