

Actueel WG van het middel SULCOTREK, 15484 N

3 november 2017

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Mais	Eenjarige breedbladige onkruiden ¹	0,85 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Werkzaamheid tegen de volgende onkruiden is onvoldoende aangetoond: *Chenopodium album* (melganzevoet), *Polygonum persicaria* (perzikkruid), *Senecio vulgare* (klein kruiskruid), *Amaranthus retroflexus* (papagaaienkruid), en *Polygonum convolvulus* (Zwaluwtong).

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van maïs het middel toepassen in 200-400 L water/ha.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

- een lage spuitboomhoogte (maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met driftarme Venturidoppen en een kantdop;
- een sleepdoek;
- minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met Hardi TwinForce luchtondersteuning en een kantdop.

Na mislukken van het gewas kan na ploegen opnieuw maïs gezaaid worden.

In verband met risico op gewasschade wordt toepassing na het vijf blad stadium (BBCH 15) ontraden.