Diana Poltl
Diseñadora Gráfica
(5411) 15 2253 2110
diana_poltl@hotmail.com
dianapoltl@gmail.com

trabajo: AZIMUT librito dorso
tamaño: ancho: **46 CM X 14.8CM**
código: ----
fecha:

K Yellow 199

PRECAUCIONES
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS.**
- **INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO Ó ENVASE AL MÉDICO**
- **NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.**
- **NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (cuando corresponda).**

SEGURIDAD PARA EL USUARIO: Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos.
Durante la manipulación del producto usar delantal, protector facial, guantes y botas, traje impermeable de PVC o traje desechable de Tyvek, máscara con filtro, antiparras, guantes y botas. En caso de realizar una aplicación vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales.
Para aplicaciones aéreas observar las disposiciones, que a nivel regional, ha establecido la autoridad competente. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

RIESGO A LA SALUD HUMANA: CLASE TOXICOLOGICA: II. MODERADAMENTE PELIGROSO.

RIESGOS AMBIENTALES:
Prácticamente no tóxico para aves, organismos acuáticos y para abejas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar el producto en su envase original, herméticamente cerrado y correctamente etiquetado. Almacenar en lugar adecuado, fresco, seco y bien ventilado, bajo llave, lejos de los niños, animales, alimentos y piensos. Almacenar lejos de sustancias incompatibles y fuentes de ignición.

INSTRUCCIONES EN ACCIDENTES: en caso de derrame, detener el escurrimiento no permitiendo que el producto entre en alcantarillados, drenajes o sursos de agua. Aisle y señalice el área contaminada.

DESTINO ADECUADO DE LOS ENVASES: Los envases vacíos de agroquímicos nunca se deben volver a utilizar. Deben ser recolectados y destruidos en forma segura y eficiente. Los envases vacíos deberán ser enjuagados tres veces (Triple lavado) y el líquido resultante agregarlo a la preparación a ser pulverizada. Perfore el envase y almacene en lugar adecuado hasta su posterior reciclado.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de Inhalación: Llevar al accidentado al aire libre. **En contacto con la piel:** quitar la ropa y lavar abundantemente con agua y jabón. Buscar asistencia médica. **En contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado.**En caso de Ingestión:** Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento. Dar de beber a la persona un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito a menos que así lo indique el centro de control de envenenamientos o un médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES: • HOSPITAL DE CLINICAS: Av. MCL LOPEZ. Tel: 481549. • **EMERGENCIAS MÉDICAS:** Av. Gral. Santos y M. Domínguez Tel: 204800.

NOCIVO

INFORMACIONES GENERALES: ADAMA ZIMUT un fungicida sistémico, translaminar y de contacto, que se utiliza en el control preventivo, curativo y antiesporulante de enfermedades fungosas que afectan al follaje de diversos cultivos tales como soja, trigo, girazol y maíz. Su modo de acción se basa en la combinación de sus principios activos: tebuconazole y azoxistrobina. El primero, perteneciente a la familia química de los triazoles, inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo parásito de la planta huésped, impidiendo la multiplicación del hongo. En cambio azoxistrobina, perteneciente al grupo químico de los metoxiacrilatos, actúa inhibiendo el proceso respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno. Además, azoxistrobina posee actividad translaminar, otorgando una mejor eficacia en cultivos densos.

PLAGAS CONTROLADAS Y DOSIS:

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS (mL/ha Producto Comercial)	MOMENTO DE APLICACIÓN
SOJA	**DE FIN DE CICLO:** Alternaria *(Alternaria spp)*, Antracnosis *(Colletotrchum truncatum)*, Mancha marrón *(Septoria glycine)*, Mancha ojo de rana *(Cercospora sojina)*, Mancha púrpura de la semilla o Tizón de hoja *(Cercospora kikuchii)*,	500 mL/ha + 500 mL/ha de Coadyuvante	Aplicar en inicio de formación de vainas (R3) hasta R6 o con la aparición de los primeros síntomas. En caso de ser necesario, realizar una segunda aplicación.
	Roya asiática de la soya *(Phakopsora pachyrhizi)*		Aplicar al observar los primeros síntomas. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y que aparezcan nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.
TRIGO	Roya anaranjada o de la hoja *(Puccinia recondita)*	700 mL/ha + 500 mL/ha de coadyuvante	Aplicar al aparecer los primeros síntomas
	Mancha amarilla *(Dreschlera tritici- repentis)*		
	Mancha de la hoja del trigo *(Septoria tritici)*		