

Activus[®] 400 SC

Aktywny i wszechstronny!

 HERBICYD



ADAMA

Sprawdzony
i niezawodny
herbicyd o szerokim
zastosowaniu.

Activus 400 SC dzięki pendimetalinie oddziałuje najskuteczniej na chwasty w okresie ich kiełkowania oraz podczas wschodów, dzięki czemu może być zastosowany dogłębowo lub nalistnie.

Activus 400 SC

- ▶ jeszcze bardziej skoncentrowany,
- ▶ długotrwały efekt herbicydowy,
- ▶ ogranicza zachwaszczenie wtórne,
- ▶ wyjątkowo szeroki zakres upraw chronionych.

Activus 400 SC – jeszcze bardziej skoncentrowany

Wysoka koncentracja substancji czynnej w litrze produktu niesie za sobą korzyści w postaci:

- ▶ oszczędności czasu przy przygotowaniu cieczy roboczej, dzięki obniżonym dawkom produktu,
- ▶ oszczędności powierzchni magazynowej.



Activus 400 SC – długotrwały efekt herbicydowy

Okres połowicznego rozpadu pendimetaliny w glebie (DT_{50}), czyli czas, w ciągu którego ilość substancji czynnej zmniejsza się o połowę, wynosi 64-86 dni. Oznacza to, że **Activus 400 SC** pozostaje

skuteczny w glebie przez kilka tygodni, ograniczając zachwaszczenie wtórne poprzez oddziaływanie na chwasty później kiełkujące.



chwasznica jednostronna



gwiazdnica pospolita



jasnota różowa



jasnota purpurowa



komosa biała



tasznik pospolity



miotła zbożowa



fiołek polny



psianka czarna



szarłat szorstki



łoboda


Activus 400 SC – wyjątkowo szeroki zakres upraw chronionych

▶ Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime.

Termin stosowania: stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Zalecana dawka: 4 l/ha.

Activus 400 SC 4 l/ha




Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych.

▶ Ziemiak

Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).


Activus 400 SC 3-4 l/ha















W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów stosować **Activus 400 SC** w mieszaninie zbiornikowej z **Racer® 250 EC**.

Zabieg wykonać na minimum 7 dni przed wschodami ziemniaka, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin, na wilgotną glebę.

Activus 400 SC 2 l/ha + Racer 250 EC 1,5 l/ha



Uprawa	Termin stosowania	Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
 Kukurydza	wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13)	4,0 l/ha
 Marchew	po siewie, do fazy gdy kieltek przebija okrywą nasienną (BBCH 00-07)	3,0-4,0 l/ha
 Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior	przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu	3,0-4,0 l/ha
 Cebula uprawiana z siewu	wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liście przebija okrywą nasienną (BBCH 00-07)	3,0-4,0 l/ha
 Cebula szalotka uprawiana z siewu*	bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07)	2,5-4,0 l/ha
	po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści	2,5-3,5 l/ha
 Czosnek*	bezpośrednio po sadzeniu ząbków, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07)	2,5-4,0 l/ha
	po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12)	2,5-3,5 l/ha
 Brokuł*	od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady	3,0-4,0 l/ha
 Sorgo zwiste, proso zwyczajne*	doglebowo, do 3 dni po siewie, ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05)	3,5-4,0 l/ha
	po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12)	
 Słonecznik zwyczajny*	wiosną po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09)	4,0 l/ha
 Plantacje nasienne traw*	jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkiowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13)	4,0 l/ha
 Pietruszka korzeniowa, pasternak, salsefia, brukiew jadalna, rzepa*	po siewie do fazy, gdy kieltek przebija okrywą nasienną (BBCH 00-07)	3,0-4,0 l/ha
 Kalarepa, kapusta brukselska, kapusta włoska*	środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu	3-4l/ha

* Uprawy małoobszarowe – odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz aplikację Agro Porada



Dołącz do nas



Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska