

MISTRAL®

Rikkakasvien torjuntaan /
Bekämpningsmedel mot ogräs



ADAMA

SPECIMEN

Tehoaine / Aktiv substans:

metributsiini / metribuzin 700 g/kg

Valmistetyyppi / Preparattyp: WG

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 2799

Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1

Luvanhaltija/ Registreringsinnehavare:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Hollanti / Nederländerna

www.adama.com

Skannataan
kätettäväksi /
Scanna för
användning



1 KG e

© ADAMA Registrations B.V.

ANEMISFIKG/03/A
T3220B/08

MISTRAL®



Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Käyttäjärühmä:

Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelysiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelysiltä.

Användargrupp:

Yrkesmässig användning

Användningsänmål: För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt samt speciellt mot baldersbrå i kumminodlingar.

VAROITUS

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Erittäin myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Valumat on kerättävä. Varastoi lukitussa tilassa. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi



VARNINGAR

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Förvaras inlåst. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

UN 3077



8 718077 003450 >



FINLAND

ANEMISFIKG/03/B
S320A/08

MISTRAL®



avaa tästä
öppnas här



Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Käyttäjryhmä:

Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.

Användargrupp:

Yrkesmässig användning

Användningsänmål: För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt samt speciellt mot baldersbrå i kumminodlingar.

VAROITUS

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

Käytä suojäkäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerättävä.

Varastoi lukitussa tilassa.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi

VARNINGAR

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

Förvaras inlåst.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



UN 3077



8 718077 003450 >



FINLAND

SUOMI

SVENSKA

ANEMISFIKG/03/B
S3220A/08

KÄYTTÖTARKOITUS

Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Varoajat:

Samana vuonna ei käsitellyllä lohkolla saa viljellä muita viljelykasveja eikä seuraavanakaan vuonna ristikkukaiskasveja (kaali, lanttu, nauris, rypsi, rapsi, camelina).

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Kasvinsuojeluaine on haitallista hyödyllisille niveljalkaisille.

Ylijäänyt, käyttökeltoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriliili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

KÄSITTELYALUEEN ULKOPUOLISEN KASVILLISUUDEN SUOJELU

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja.

Tullikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä		
Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet	
	50 %	vähintään 75 %
5 m	3 m	0 m

KÄYTTÖOHJE

Peruna:

Viljelys ruiskutetaan istutuksen jälkeen ennen perunan taimelle tuloa tai perunan nuorella taimiasteella viimeistään, kun perunan taimet ovat 5 - 6 cm korkeita. Jaettu käyttö on paikallaan, kun pellossa on valvattia ja pähkämöä sekä kosteilla ja multavilla mailla. Tällöin pesäkekäsittely valvatin ja pähkämön torjumiseksi tehdään perunan ollessa n. 10 cm korkea. Rikkakasvien taimettumisen jälkeen ruiskutettaessa, kun ruiskutusää on kuiva tai kun pellossa on runsaasti valvattia, pähkämöä, mataraa, peippiä ja kiertotatarta, voidaan ruiskutusnesteeseen tehon parantamiseksi lisätä Sunoco 11 E/3 -öljyä 2 - 3 L/ha.

Käyttömäärät Kg/ha:

Maalaji	Ennen perunan taimiasteella		Perunan nuorella taimettumista
Vähämultaiset hietamaat	0.3 - 0.5	tai	0.2 - 0.3*
Muut maalajit	0.4 - 0.6	tai	0.3 - 0.4*
Jaettu käyttö	0.2 - 0.3		0.2 - 0.3*

(*pesäkekäsittelynä 0.5)

Käytettäessä valmistetta 0.2 kg/ha rikkakasvien taimettumisen jälkeen, on ruiskutusnesteeseen sekoitettava Sunoco 11 E/3 -öljyä 2-3 L/ha. Tätä seosta käytetään vain erittäin edullisissa torjuntaolosuhteissa.

Tankkiseoksessa Titus 25DF -valmisteiden kanssa on valmisteen käyttömäärä 0.15-0.2 kg/ha

(Sito Plus -kiinnitettä lisätään 0.2 L/ha).

Vettä käytetään 150 - 300 L/ha.

Porkkana:

Käytetään viimeistään 3 päivää ennen porkkanan taimettumista ja/tai kun porkkanassa on vähintään 2 kasvulehteä. Osittain puutteellisen rikkakasvitehon vuoksi käytetään yleensä torjuntaohjelmissa muiden rikkasvihävitteiden kanssa. Voidaan käyttää tankkiseoksena Afalon-nesteen tai Fenixin kanssa.

Käyttömäärä yksinään 0.075-0.15 kg/ha. Käsittely voidaan jakaa useaan ruiskutuskertaan, mutta kokonaiskäyttömäärä ei saa ylittää 0.15 kg/ha. Tankkiseoksissa suurin sallittu käyttömäärä yhdellä ruiskutuskerralla on 0.075 kg/ha.

Vettä käytetään 150 - 300 L/ha.

Herne:

Ilman palkoja korjattava herne:

Voidaan käyttää puolilehdettömillä ja lehdettömillä ruoka-, siemen- ja reuhernelajikkeilla sekä elintarviketeollisuuden sopimusviljelyksillä kestäviksi todetuilla lajikkeilla. Kasvusto ruiskutetaan herneen ollessa 5 - 10 cm.

Käyttömäärä: 0.2 - 0.4 kg/ha, vesimäärä 300 L/ha.

Ruiskutettaessa tankkiseoksena jonkin muun herneelle hyväksytyyn valmisteen kanssa, on Mistralin käyttömäärä 0.2 kg/ha. Herneellä ei saa käyttää Sunoco 11 E/3 -öljyä eikä tankkiseoksessa valikoivia juolavehnan torjuntaan tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita.

Palkoineen korjattava herne:

Käytetään joko ennen herneen taimettumista tai herneen ollessa 5-10 cm. Voidaan käyttää myös harsokatteen alla kasvatettavalla herneellä. Harso poistetaan ruiskutuksen ajaksi, mieluiten jo vuorokautta ennen ruiskutusta. Ennen herneen taimettumista voidaan ruiskuttaa tankkiseoksena Fenix-valmisteeseen kanssa. (Fenixin käyttömäärä seoksessa 1,5-2,0 L/ha.). Mistralin käyttömäärä on yksinään 0,075-0,1 kg/ha ja tankkiseoksessa 0,05-0,075 kg/ha.

Kumina:

Kuminalla siemenrikkakasvien torjunta tehdään yleensä kylvökeväänä muilla rikkakasvihävitteillä. Mistralia voidaan käyttää kylvövuonna loppukesällä, elo-syyskuussa taimettuvan saunakukan ja muiden siemenrikkakasvien torjuntaan. Paras teho saunakukkaan saadaan juuri sen taimettuessa. Tällöin kuminan taimissa tulee olla vähintään viisi kasvulehteä ja kasvuston tulee olla vähintään 10 cm korkea, terve ja hyvässä kasvussa. Käyttömäärä on 0,075-0,1 kg/ha. Ei saa sekoittaa muihin rikkakasvihävitteisiin.

HUOMAUTUKSET

Vaarallista muille viljelykasveille.

Vaikuttaa yrttimäisiin rikkakasveihin hieta- ja savimailla lehtien ja maan kautta, eloperäisillä mailla pääasiassa vain lehtien kautta.

Tehoaa hyvin useimpiin yrttimäisiin siemenrikkakasveihin ja kylänurmikkaan sekä tyydyttävästi peippiin ja tatarlajeihin. Teho mataraan on riittämätön, kiertotattareen ja ohdakkeeseen heikko.

Paras tulos saadaan ruiskutettaessa lämpimällä säällä maan ollessa kosteata. Kuivalla säällä aine tehoaa parhaiten kun ruiskutetaan aamulla ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea. Ruiskutusta yli +25 asteen lämpötilassa on vioittumisvaaran takia syytä välttää, jos viljelykasvi on jo taimella.

Herneellä ja perunalla alinta käyttömäärää (0,2 kg/ha) voi käyttää vain erityisen hyvissä oloissa, eli kun rikkakasvit ovat kasvaneet lämpimissä ja kosteissa oloissa, kun ruiskutushetkellä on lämmintä ja kosteaa, kun rikkakasvilajisto koostuu jauhosavikasta, pillikkeestä ja pihatähtimöstä ja kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella.

Perunan multausta tai harausta heti ruiskutuksen jälkeen tulee välttää, koska se tässä vaiheessa edistää rikkakasvien taimelle tuloa. Ennen kasvuston sulkeutumista tehtävä multa puolestaan nopeuttaa maaperässä pysyvän Mistralin hajoamista ja vähentää valmisteen jälkivaikutusta. Syksyllä maa tulee kyntää valmisteen hajoamisen edistämiseksi. Perunalajikkeiden kestävyudessa voi olla eroja, kun ruiskutus tehdään perunan ollessa taimella. Ei suositella Fambo-lajikkeelle.

Valmisteen teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainitulla kiinnitteellä.

Säilytettävä kuivassa ja viileässä.

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 18.12.2006.

ANVÄNDNINGSMÅL

För bekämpning av ogräs i odlingar av potatis, morot och ärt samt speciellt mot baldersbrå i kumminodlingar.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Karenstid:

På ett behandlat skifte får man inte odla andra odlingsväxter samma år, och inte ens följande år får man odla korsblomstriga växter (kål, kålrot, rova, rybs, raps, camelina).

FÖRHINDRANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Bekämpningsmedlet kan transporteras i marken, varför det inte får användas på viktiga eller andra för vattenansaffning lämpliga grundvattenområden (grundvattenområden klass I och II). Runt brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten bör man lämna en minst 30–100 meter bred obehandlad zon. Användning på grova mojordar och grövre jordarter borde undvikas.

Bekämpningsmedlet är skadligt för nyttiga ledfotingar.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

SKYDDSUTRUSTNING

Skyddsdräkt, gummistövlar, skyddshandskar som tål kemikalien (t.ex. nitril) och huvudbonad bör användas vid hanteringen. Vid tillblandning av brukslösning, vid spridning med handdrivna spridningsredskap och i långvariga besprutningsarbeten bör man dessutom använda andningskydd försett med kombinationsfilter (P2/A2).

SKYDD AV FLORAN UTANFÖR BEHANDLINGSOMRÅDET

Produkten kan skada grödor och vilda plantor utanför behandlingsområdet.

För att förhindra avdrift rekommenderas följande skyddszoner:

Säkerhetsavstånd med olika munstycken		
Spaltspridar munstycken	Avdriftsreducerance munstycken	
	50 %	Min. 75 %
5 m	3 m	0 m

BRUKSANVISNING

Potatis:

Odlingen besprutas efter sättningen innan potatisen kommer upp, eller på tidigt plantstadium, senast då potatisplantorna är 5-6 cm höga. En delad behandling är motiverad, om det på åkern växer mjölkdistel och knölsyska, samt på fuktiga och mullrika åkrar. Härvid behandlas mjölkdisteln och knölsyskan som punktbehandling då potatisen är ca 10 cm hög. Vid besprutning efter att potatisen kommit upp, då vädret vid besprutningen är torrt eller om det finns rikligt med mjölkdistel, knölsyska, måra, plister och åkerbinda, kan man för att förbättra effekten tillsätta 2-3 liter/ha Sunoco 11 E/3-olja i sprutvätskan.

Bruksmängder kg/ha:

Jordart	Före plantuppkomsten		På potatisens tidiga
Mullfattiga mojordar	0.3 - 0.5	eller	0.2 - 0.3*
Övriga jordarter	0.4 - 0.6	eller	0.3 - 0.4*
Delad behandling	0.2 - 0.3		0.2 - 0.3*

(* vid punktbehandling 0,5)

Då man efter ogräsen uppkomst använder dosen 0,2 kg/ha, bör man tillsätta 2-3 L/ha Sunoco 11 E/3 i sprutvätskan. Denna blandning används endast i mycket fördelaktiga förhållanden. I tankblandning med produkten Titus 25 DF är bruksmängden 0,15 - 0,2 kg/ha (fästmedlet Sito Plus tillsätts med dosen 0,2 L/ha).
Vattenmängden är 150 - 300 L/ha.

Morot:

Används senast 3 dagar innan moroten kommer upp och/ eller då moroten har minst 2 örtblad. På grund av sin delvis bristfälliga effekt mot ogräs används medlet i allmänhet i bekämpningsprogram tillsammans med andra ogräsmedel. Kan användas i tankblandning med Afalon-neste eller Fenix. Bruksmängd vid användning allena är 0,075-0,15 kg/ha. Behandlingen kan fördelas på flera olika besprutningar, men den totala dosen får inte överstiga 0,15 kg/ha. I tankblandningar är den största tillåtna bruksmängden vid en sprutgång 0,075 kg/ha.
Vattenmängden är 150 - 300 L/ha.

Ärt:

Ärt som skördas utan balja:
Kan användas på bladlösa och halvbladlösa mat-, utsädes- och foderärtsorter samt på industrins kontraktsodlingar på sorter som konstaterats härdiga. Beståndet besprutas då ärten är 5 - 10 cm.
Bruksmängd: 0,2-0,4 kg/ha, vattenmängden är 300 L/ha.

Vid besprutning i tankblandning med något annat preparat som är godkänt för ärt, är bruksmängden för Mistral 0,2 kg/ha. På ärt får man inte använda Sunoco 11 E/3-olja eller selektiva kvickrotsmedel i tankblandning.

Ärt som skördas med balja:

Används antingen före plantuppkomsten eller då ärten är 5-10 cm.. Kan också användas på ärt som odlas under fiberduk. Fiberduken avlägsnas före besprutningen, helst redan ett dygn innan. Kan sprutas i tankblandning med Fenix innan ärtorna kommit upp (Bruksmängden Fenix är i blandningen 1,5-2,0 L/ha). Bruksmängden Mistral ensamt är 0,3-0,35 kg/ha och i tankblandning 0,05-0,075 kg/ha.

Kummin:

I kummin bekämpas fröogräs i allmänhet såningsåret med andra preparat. Mistral kan användas såningsåret på sensommaren, i augusti-september, för bekämpning av groende baldersbrå och andra fröogräs. Den bästa effekten mot baldersbrå fås just då den håller på att bilda planta. Härvid bör kumminplantorna ha minst fem örtblad, och beståndet bör vara minst 10 cm högt, friskt och vid god tillväxt. Bruksmängden är 0,075 - 0,1 kg/ha. Får inte blandas med andra ogräsmedel.

ANMÄRKNINGAR

Farligt för andra odlingsväxter.

Har effekt mot örtartade ogräs på mo- och lerjordar via bladen och marken, på organiska jordarter i huvudsak endast via bladen.

Har god effekt mot de flesta örtartade ogräs och mot vitgröe samt tillfredsställande effekt mot plister och pilörtsarter. Effekten mot måra är otillräcklig, mot åkerbinda och åkertistel svag. Den bästa effekten fås vid besprutning i varmt väder då marken är fuktig. Vid torrt väder har preparatet den bästa effekten då man sprutar på morgonen när den relativa luftfuktigheten är hög. Besprutning vid mer än bör undvikas på grund av risken för skador, om odlingsväxten redan har kommit upp.

I ärt och potatis kan den lägsta bruksmängden (0,2 kg/ha) endast användas vid särskilt goda förhållanden, d.v.s. då ogräsen har vuxit i varma och fuktiga förhållanden, då det är varmt och fuktigt vid spruttidpunkten, då ogräsfloran består av svinmålla, dån och våtarv och då ogräsen är på hjärtbladsstadiet.

Man bör undvika myllning eller harvning genast efter besprutningen, då det i detta skede befrämjar groendet av nya ogräs. En myllning strax innan raderna sluter sig befrämjar å sin sida nedbrytningen av det i jorden långsamt nedbrytbara Mistral, och minskar risken för efterverkan. Marken bör plöjas på hösten för att befrämja nedbrytningen.

Det kan finnas skillnader i de olika potatissorternas härdighet, då besprutningen görs på plantstadiet. Rekommenderas inte för sorten Fambo.

Preparatets effekt har undersökts endast tillsammans med det i bruksanvisningen nämnda fästmedlet.

Förvaras torrt och svalt.

Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel 18.12.2006.

MISTRAL®

Rikkakasvien torjuntaan /
Bekämpningsmedel mot ogräs

Tehoaine / Aktiv substans:
metributsiini / metribuzin 700 g/kg
Valmistetyyppi / Preparattyp: WG
Rekisterinumero / Registreringsnummer: 2799
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1

Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com

© ADAMA Registrations B.V.

10 x 1 KG



ADAMA

ANEMISFI1KG/03/C1
T3220C/08

MISTRAL®

MISTRAL®

Rikkakasvien torjuntaan /
Bekämpningsmedel mot ogräs



Tehoaine / Aktiv substans:
metributsiini / metribuzin 700 g/kg
Valmistetyyppi / Preparattyp: WG
Rekisterinumero / Registreringsnummer: 2799
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC C1

Luvanhaltija/ Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com

© ADAMA Registrations B.V.

10 x 1 KG

Skannataan
käyttäväksi /
Scanna för
användning



Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan
peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä
sekä erityisesti saunakukan torjuntaan
kuminaviljelyksiltä.

VAROITUS

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa
tai toistuvassa altistumisessa.

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Erittäin myrkyllistä vesieläille,
pitkäaikaisia häirtavaikutuksia.

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/
höyryä/suihketta.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Altistumisen tapahduttua tai jos
epäillään altistumista: Hakeudu
lääkəriin.

Valumat on kerättävä.

Varastoi lukitussa tilassa.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvien vaarojen
välttämiseksi.

Användargrupp: Yrkesmässig användning
Användningsämål: För bekämpning av ogräs i
odlingar av potatis, morot och ärt samt speciellt
mot baldersbrå i kumminodlingar.

VARNINGAR

Kan orsaka organskador genom lång eller
upprepad exponering.

Misstänks kunna skada fertiliteten.

Misstänks kunna skada det ofödda
barnet.

Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/
sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd.

Vid exponering eller misstanke om
exponering Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

Förvaras inlåst.

För att undvika risker för människors hälsa och
för miljön, följ bruksanvisningen.



UN 3077



FINLAND



ANEMISF1KG/03/C2
T3220D/08

MISTRAL®



FINLAND

40 x 10 KG



8 718077 008578 >



ANEMISFI1KG/03/X
T3220P/08

ADAMA
Northern Europe B.V.