

TOMAHAWK® 200 EC

Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Skannataan
käytettäväksi
/Scanna för
användning



Tehoaine / Aktiva substanser:
Fluoksipyyri 200 g/L (fluoksipyyri-
l-metyyliheptyyliesteri 292 g/L)
Fluoxipyr 200 g/L (fluoxipyr-l-
metyyliheptyylester 292 g/L)

Valmistetyyppi / Preparattyp: EC
Vaikutustapa / Verkningsmekanism:
HRAC O

**Valmistuserän numero ja
valmistuspäivä / Tillverkningspartiets
nummer och tillverkningsdatum:**
Näytä pakkauksesa / se förpackning

**Rekisterinumero / Registrerings-
nummer: 3205**
**Luvanhaltija / Registrerings-
innehavare:**
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com



5 L e

* ADAMA Registrations B.V.

TOMAHAWK® 200 EC



Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätöhralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, apilattomien nurmien suojaajiloista sekä apilattomista nurmista, nurmikoista ja golfnurmilta.

Användningsändamål:

Mot ogräs i häst- och värvete, höstkorn och vårkorn, havre, råg, rågvete, i skyddssäd för klöverfria vallar samt i klöverfria vallar, i gräsmattor och golfbanor.

VAARA

Voii olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huumausta.

Erittäin myrkyllistä vesieläille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:

Ota välittömästi yhteys

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/
Iääkəriin/...

JOS KEMIKAALIA JOUTUU

SILMIIN: Huuhto huolellisesti

vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, jos sen voi

tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Ei saa oksennuttaa.

Valumat on kerättävä.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä

ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

Varastoi lukitussa tilassa.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai

halkeilua.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

FAARA

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägar.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan göra att man blir dåsig eller omtäcktad.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/
läkare/...

VID KONTAKT MED ÖGONEN:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Framkalla INTE kräkning.

Samla upp spill.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Förvaras inlåst.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



8 718077 011776 >

UN 3082



FINLAND

ANETOMF51LT/02/B

S5861B_03

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar till allmän avstjälpningsplats.

SKYDD AV FLORAN UTANFÖR BEHANDLINGSOMRÅDET

Produkten kan skada grödor och vilda plantor utanför behandlingsområdet. För att förhindra avdrift rekommenderas följande skydds zoner :

		Säkerhetsavstånd med olika munstycken		
		Avdriftsreducerance munstycken		
Gröda	Spaltspridar munstycken	50 % Reduktion	75 % Reduktion	90 % Reduktion
Vårsäd	0 m	0 m	0 m	0 m
Höstsäd Gräsmattor (nyanlagd)	3 m	0 m	0 m	0 m
Vallar, golfbanor och gräsmattor	5 m	3 m	0 m	0 m

RESISTENSHANTERING

Den aktiva substansen fluoroxipyr tillhör HRAC-grupp O (syntetiskt auxin). Risken för utveckling av resistens mot detta preparat hos de objekt det används mot är för närvarande liten.

SKYDDSUTRUSTNING

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad användas. I arbetssituationer med risk för stänk bör dessutom ansikts/ögonskydd användas och i situationer med risk för exponering av andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

BRUKSANVISNING

Höstsäd besprutas tidigt på våren efter att tillväxten börjat. Vårsäd och skyddssäd för klöverfria vallar besprutas då brodden är på 2-bladsstadiet och fram till slutet av bestockningen. Klöverfria vallar, som anläggs utan skyddssäd, besprutas med den lägsta dosen då gräset har 2-4 blad. Ensilage- och hövallar samt gräsmattor besprutas på våren när maskrosen växer kraftigt. Betsvallar besprutas på försommaren, då gårdssyran, som är det viktigaste ogräset, är på fullt utvecklat rosettbladsstadium.

Bruksmängder:

Höstsäd:
0,5-0,7 L/ha sprutat allena
0,4-0,5 L/ha i tankblandningar
Vårsäd och skyddssäd:
0,45-0,5 L/ha sprutat allena
0,4-0,45 L/ha i tankblandningar

Vall som anläggs utan skyddssäd:
0,6-0,7 L/ha sprutat allena
0,5 L/ha i tankblandningar
Ensilage- och hövallar, golfbanor, gräsmattor, samt odlade betesvallar:
1,35-1,8 L/ha, i tankblandningar

Vattenmängd 100-300 L/ha

ANMÄRKNINGAR

Säd och skyddssäd: besprutning av Inari-korn skall undvikas på grund av dess känslighet för skador. Skadan sänker i allmänhet inte skörden. Om preparatet används allena är det effektivt mot måra, pilörts-arter (Polygonum) våtarv, plister, förgätmigej, harkål och mjölkstisel. Mot svinmålla och baldersbrå är effekten svag.

För att få effekt också mot svinmålla, lomme, jordrök, baldersbrå och spergel kan man spruta preparatet i tankblandning med MCPA eller en lågdosherbucid. Vallar och gräsmattor: Preparatet är effektivt mot syror och skräppor (Rumex), maskros, ranunkel, nässla, förgätmigej och groblad. Preparatet får inte blandas med medel mot flyghavre. Ärt, böna och andra baljväxter samt tomat och potatis är synnerligen känsliga för preparatet. Sprutan bör rengöras omsorgsfullt genast efter behandlingen, då man övergår till att bespruta känsliga växter. Användning av preparatet rekommenderas inte om gräsmattan lider av torka, väta, nattfrost eller dylikt. Man kan vistas på gräsmattan då bekämpningsmedlet har torkat. Tillverkaren ansvarar för att preparatet har sådan sammansättning som anmäls, då preparatet finns i sin originalförpackning och har lagrats på rätt sätt. Vädret, växtbeståndets skick och liknande faktorer påverkar bekämpningens resultat. Tillverkaren ansvarar inte för preparatets effekt under avvikande förhållanden eller vid felaktig användning. Den lägsta förvaringstemperaturen är -5°C.

Livsmedelssäkerhetsverket Tukes har 14.6.2017 godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel.

TOMAHAWK® 200 EC



avaa tästä
öppnas här



Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnäitä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisevehnäitä, apilattomien nurmien suojavaivoista sekä apilattomista nurmista, nurmikoista ja golfnurmilta.

Användningsändamål:

Mot ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, havre, råg, rågvete, i skyddssäd för klöverfria vallar samt i klöverfria vallar, i gräsmattor och golfbanor.

VAARA

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Erittäin myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä suojaesineitä/suojavaatetusta/silmien suojausta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/... JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. El saa oksennuttaa. Valumat on kerättävä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Varastoi lukitussa tilassa. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

FARA

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/... VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Framkalla INTE kräkning. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvaras inlåst. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



8 718077 010823 >

UN 3082



FINLAND

SUOMI

KÄYTTÖTARKOITUS

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevävehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, apilattomien nurmien suojaviljoista sekä apilattomista nurmista, nurmikoista ja golfnurmilta.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Eläimet voi päästää laitumelle tai satoa korjata 10 vuorokauden kuluttua käsittelystä. Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua. Ei saa käyttää apilapitoisella suojaviljalla ja nurmella.

Käsittelyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasviuuneissa kasvualustana.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa alentava suutin ¹⁾		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Kevät- ja syysviljat Perustettava nurmi	3 m	3 m	3 m	3 m
Pysyvä nurmi	5 m	3 m	3 m	3 m

¹⁾ Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

KÄSITTELYALUEEN ULKOPUOLISEN KASVILLISUUDEN SUOJELU

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Käyttömäärä	Viuhkasuutin	Suojaetäisyys eri suutintyypeillä		
		Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
Kevätviljat	0 m	0 m	0 m	0 m

Syysviljat Perustettava nurmi	3 m	0 m	0 m	0 m
Pysyvä nurmi	5 m	3 m	0 m	0 m

RESISTENSSIN HALLINTA

Tehoaine fluorksiipyri kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään O (synteettinen auksiini). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä pieni.

SUOJAINOHJEET

Valmistetta käsitellessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinetä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Tehoaine florasulaami kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään B (ALS, aminohapposynteesin esto). Toinen tehoaine fluorksiipyri kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään O (synteettinen auksiini). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on tällä hetkellä pieni.

KÄYTTÖOHJE

Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa. Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan oraan 2-lehtiasteelta lähtien pensomisen loppuun. Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinä 2-4-lehti-vaiheessa pienintä suositeltua annosta käyttäen.

Säilörehu- ja heinänurmet sekä nurmikot ruiskutetaan keväällä voikukan ollessa voimakkaassa kasvussa. Koska hierakka on tärkein torjuntakohde viljellyillä laitumilla, ne ruiskutetaan alkukesällä, kun hierakka on täydellä ruusukeasteella.

Käyttömäärät:

Syysviljat:

0,5-0,7 L/ha yksin ruiskutettaessa

0,4-0,5 L/ha tankkiseoksena

Kevätviljat ja suojaviljat:

0,45-0,5 L/ha yksin ruiskutettaessa

0,4-0,45 L/ha tankkiseoksena

Perustettavat nurmet ilman suojaviljaa:

0,6-0,7 L/ha yksin ruiskutettaessa

0,5 L/ha tankkiseoksena

Säilörehu- ja heinänurmet, nurmikot, golfnurmet sekä viljeltyt laitumet:

1,35-1,8 L/ha, ei tankkiseoksia

Vesimäärä 100-300 L/ha.

HUOMAUTUKSET

Viljat ja suojaviljat: Inari-ohran ruiskuttamista tulee välttää sen vioitusherkkyyden takia. Vioitus ei kuitenkaan yleensä alenna satoa. Valmiste tehoaa yksinään käytettynä mataraan, tatarlajeihin, pihatähtimöön, peippeihin, lemmikkiin, linnunkaaliin sekä peltovalvattiin. Valmisteen teho on heikohko savikkaan ja saunakukkaan.

Tehon laajentamiseksi mm. savikkaan, lutukkaan, emäkkiin, saunakukkaan ja hatikkaan voidaan valmiste ruiskuttaa seoksena MCPA:n tai pienannosherbisidin kanssa. Nurmet ja nurmikot: Valmiste tehoaa seuraaviin rikkakasveihin: hierakat, voikukka, leinikki, nokkonen, suolaheinät, lemmikki, piharatamo.

Valmiste ei sovellu sekoitettavaksi hukkakaurahävitteiden kanssa.

Valmisteele erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttäessä ruiskuttamaan arkoja kasveja. Valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärsii kuivuudesta, liiasta vedestä, yöhalloista ym.

Nurmikoilla voidaan oleskella ruiskutusnesteen kuivuttua.

Alin varastointilämpötila on -5°C.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 14.6.2017.

SVENSKA

ANVÄNDNINGSAÄNDAMÅL

Mot ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn, havre, råg, rågvete, i skyddssäd för klöverfria vallar samt i klöverfria vallar, i gräsmattor och golfbanor.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Djur kan gå på bete eller skörden kan bärgas 10 dygn efter behandlingen. Preparatet bör sprutas före början av sädens stråskjutning. Får inte användas i skyddssäd eller vall som innehåller klöver. Halm efter gröda som behandlats får inte komposteras och användas som växtunderlag i växthus.

FÖREBYGGANDE AV SKADOR PÅ MILJÖN

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder.

Vid sprutning med traktorspruta av områden som är begränsade till vattendrag ska följande skyddsavstånd från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer:

Gröda	Munstycke	Avdriftsreducerande munstycken ¹⁾		
		Spaltspridare	50 % Reduktion	75 % Reduktion
Höstsäd, vårsäd, och gräsmattor (nyanlagd)	3 m	3 m	3 m	3 m
Vallar, gräsmattor och golfbanor	5 m	3 m	3 m	3 m

¹⁾ Vindavdriftreducerande spridningsmunstycken är bland annat munstycken med luftassistans. De vindavdriftreducerande spridningsmunstycken som säljs i Finland finns på Tukes webbsida www.tukes.fi/ vattendragsbegränsning. Där finns också de tillåtna körhastigheterna och brukstrycken.

TOMAHAWK® 200 EC

Rikkakasvien torjuntaan /
Bekämpningsmedel mot
ogräs

Tehoaine / Aktiva substanser:

Fluroksipyyri 200 g/L
(fluroksipyyri-l-metyyliheptyyliesteri 292 g/L)
Fluroxipyr 200 g/L (fluroxipyr-l-metylheptylester 292 g/L)
Valmistetyyppi / Preparattyp: EC
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC O

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä /
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:
Näytä pakkauksesa / se förpackning

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 3205
Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com

4 x 5 L

© ADAMA Registrations B.V.



ADAMA

T5861C_03

ANETOMF15LT/02/CI

TOMAHAWK® 200 EC

TOMAHAWK® 200 EC

Rikkakasvien torjuntaan /
Bekämpningsmedel mot
ogräs



Tehoaine / Aktiva substanser:

Fluoksipyyri 200 g/L
(fluoksipyyri-l-metyyliheptyyliesteri 292 g/L)
Fluoxipyr 200 g/L (fluoxipyr-l-metylheptylester 292 g/L)
Valmistetyyppi / Preparattyp: EC
Vaikutustapa / Verkningsmekanism: HRAC O

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä /
Tillverkningspartiets nummer och tillverkningsdatum:
Näytä pakkauksesa / se förpackning

Rekisterinnumero / Registreringsnummer: 3205
Luvanhaltija / Registreringsinnehavare:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK Leusden
Hollanti / Nederländerna
www.adama.com

4 x 5 L

© ADAMA Registrations B.V.

Skannataan
käyttäväksi /
Scanna för
användning



Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevävehnältä,
syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä,
apilattomien nurmien suojaviljoista sekä apilattomista
nurmista, nurmikoista ja golfnurmilta.

Användargrupp: Yrkesmässig användning

Användningsändamål:

Mot ogräs i höst- och vårvete, höstkorn och vårkorn,
havre, råg, rågvete, i skyddssäd för klöverfria vallar
samt i klöverfria vallar, i gräsmattor och golfbanor.

VAARA

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan
hengitysteihin.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja
huimausta.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille,
pitkäaikaisia hättävaiikutuksia.
Vältä pölyn/savun/kaasun/
sumun/höyryn/suihkeen
hengittämistä.

Käytä suojakäsineitä/
suojavaatetusta/
silmiensuojainta/
kasvosuojainta.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:

Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/
lääkäriin/...

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka
huuhtomista.

El saa oksennuttaa.
Valumat on kerättävä.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä
tiivisti suljettuna.

Varastoi lukitussa tilassa.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

FARA

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner
i luftvägarna.

Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan göra att man blir däsigt eller
omtöcknad.

Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Undvik att inandas damm/rök/
gaser/dimma/ångor/sprej.

Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Kontakta
genast GIFTINFORMATION-
CENTRALEN/läkare/...

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

Framkalla INTE kränkning.


Samla upp spill.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Förvaras inlåst.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
För att undvika risker för människors hälsa och för
miljön, följ bruksanvisningen.



ANETOMFIL5T/02/C2

T5861D_03




8 718077 011783 >

UN 3082




FINLAND

TOMAHAWK® 200 EC




FINLAND



VAARA/FARA

30 x 20 L



UN 3082

ANETOMFI5LT/02/X

T5861P_03



ADAMA
Northern Europe B.V.