

แอสเมเปอร์



▶ ด้วย สารพลังดูดซึม อิมิดาโคลพริด 25% สารกลุ่ม 4A (CNI) ผสมกับ สารพลังน็อค โบเฟนทริน 5% สารกลุ่ม 3A (Pyrethroid) ลดปัญหาการดื้อยา



▶ **ประหยัด** ป้องกันกำจัด แมลงปากดูด แมลงปากกัด



เพลี้ยจักจั่น



เพลี้ยไก่แจ้กุเรียน



เพลี้ยไก่แจ้ส้ม



เพลี้ยไฟ



หนอนชอนใบ



หนอนกัดใบ



หนอนเจาะผล



▶ ด้วย **สูตรครีม** ใช้ง่ายสามารถผสมกับฮอร์โมนหรือสารกำจัดศัตรูพืชอื่นได้ดี ปลอดภัยต่อพืช ฟันได้ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะใบอ่อน ระยะดอก ถึงระยะผลอ่อน



สูตรครีมเข้มข้น



ระยะใบอ่อน



ระยะดอก



ระยะผลอ่อน

▶ อัตราการใช้ในผักและไม้ผล (ต่อน้ำ 20 ลิตร)



ทุเรียน



ลำไย



พริก



มะเขือเทศ



แตงโม



มันฝรั่ง



คะน้า



ผักกาดขาวปลี



ส้ม



มะม่วง

อัตรา 15-20 ซีซี

อัตรา 20-30 ซีซี

▶ กรณีที่พบการระบาดของเพลี้ยไฟที่รุนแรง..!

ควรใช้ **แอสเมเปอร์** หรือ **โคฮินอร์ เอ็กซ์** ผสมกับสารต่างกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยไฟ เช่น ผสมกับ **โรมอน สารกลุ่ม 15** อัตรา 10 ซีซี สารกลุ่มป้องกันการลอกคราบ เพื่อลดปริมาณเพลี้ยได้ หรือ ผสม **สารกลุ่ม 6** อะบาแม็กติน อัตรา 10 ซีซี หรือ อีมาแม็กติน อัตรา 5 กรัม หรือ ผสม **สารกลุ่ม 2B** ฟิโปรนิล อัตรา 20 ซีซี หรือ ผสม **สารกลุ่ม 5** สไปนีโทแรม อัตรา 3-5 ซีซี จะได้ประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเพลี้ยไฟ

