

AGİL® EXTRA 100 EC



GRUP **A**

HERBİSİT (Yabancı Ot İlaç)

Emülsiyon Konsantre (EC)

ADAMA

100 g/l PROPAQUİZAFOP

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YAŞAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ, ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. İlaçın yutulması halinde mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal görülebilir. **İLKYARDIM ÖNEMLERİ:** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluması halinde; temiz havaya çıkarınız. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapınız. Derhal doktor çağırınız. **Yutulması halinde;** kişinin bilinci açık ise ağzını iyice yıkayınız. Kusturmayınız. Derhal doktor çağırınız.

Giltle teması halinde; Kirli tüm giysi ve ayakkabılarınızı çıkarınız. Heran bol su sabunla yıkayınız. Gerekirse bir doktora danışınız. **Gözle teması halinde;** Bkz. önlem ifadeleri P305+P351+P338 **ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ**

Özel bir antidot yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayınız. **ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

TRACEABILITY PRINTING
51/58 x 27 mm

1Le

İMAL TARİHİ: AMBALAJIN ÜZERİNDEDİR.
SON KULLANMA TARİHİ: AMBALAJIN ÜZERİNDEDİR.
SARJ NO: AMBALAJIN ÜZERİNDEDİR.
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 01/09/1996 ve 3001

NET MİKTARI: 1 L
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL): 2.214,60 TL

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Kanyas (Sorghum halepense)	100 ml/da	Çıkış sonrası, Kanyas 25-40 cm iken	90 gün
Patates	Kanyas (Sorghum halepense) Darıcan (Echinochloa crus-galli) Yapışkan ot (Setaria verticillata)	50 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde, Kanyas 20-40 cm iken	28 gün
*Bağ	Kanyas (Sorghum halepense)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyas 25-40 cm iken	-
Şekerpancarı	Kanyas (Sorghum halepense)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyas 25-40 cm iken	-
Kırmızı Mercimek	Kısrı yabancı yulaf (Avena sterilis) Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)	60 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	90 gün
Soğan	Yabancı yulaf (Avena fatua) Kus yemi +Yumusak başaklı kusyemi (Phalaris paradoxa)	35 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	-
Ayçiçeği	Darıcan (Echinochloa crus-galli) Kanyas (Sorghum halepense) Yapışkan ot (Setaria verticillata)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyas 25-40 cm iken.	56 gün
Domates	Kanyas (Sorghum halepense) Darıcan (Echinochloa crus-galli)	100 ml/da 75 ml/da	Çıkış sonrası Çıkış sonrası	56 gün 56 gün

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Kanola	Kanyas (Sorghum halepense) Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) Kus yemi +Yumusak başaklı kusyemi (Phalaris paradoxa) Yabancı yulaf (Avena fatua) Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides) Tavşanbıyığı -Salakm otu (Poa annua)	50 ml/da	Çıkış sonrası Yabancı otların kardeşlenme devresinde	56 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda değilse ilaç su deposu ilave edilir. Karıştırma devam edilecek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra yarıya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekora kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yapışmaz hazneli meme kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmamalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamaların günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkınmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

AGİL EXTRA 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancısıdır. AGİL EXTRA 100 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından süratle alınır ve yabancı otların stolon ve rizom gibi toprak altı kısımlarına taşınır. AGİL EXTRA 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde kullanılabilir ancak dar yapraklı yabancı otlar uygulama anında çıkış almamalıdır. AGİL EXTRA 100 EC ilaçlama sırasında yabancı otların aktif büyüme devresinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. İlaçlamada iyi bir kaplama yapılması lazımdır. Uygulamaların günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

AGİL EXTRA 100 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmez. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için AGİL EXTRA 100 EC'nin aynı üretim sezonunda önerilen toplam uygulama sayısını aşmamayı. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARISILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir kısma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

İÇİNDEKİLER Propaquizafop

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H304 Solunum yoluyla nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H411 Suda oturmada uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve cilt lekelerine neden olabilir.
EUH208 Propaquizafop içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.



ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile en az 15 dakika dikkatlice durulayın. Takli ve yapması kalırsa, kontak lensleri çıkartın. Durulmaya devam edin.
P331 Kusturmayınız.
P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulandırmaktan kaçınılmalıdır.
- Kullanıldıkten sonra boş ambalajın usulüne uygun imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Kendi ambalajında ağız kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılan yerde, güneş ve rutubetten
- uzakta muhafaza ediniz, 35 °C'nin üzerinde depolamayınız.
- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Bitki koruma ürününün kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararların firma sorumluluğu kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminde, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumlu değildir. Kullanılan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bitki koruma ürününün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece teslim sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ: Adama Agon Ltd. Northern Industrial Zone P.O. Box 262 Ashdod, 7710201 Israel

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Sti. Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/0806, Konak/İZMİR
Tel: 0232 462 61 40

UFİ: QWVN-C2AA-100M-5NEF

Product name	AGİL® EXTRA 100 EC		
Country	TR		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w x h)	915mm x 125mm		
Label date	14:58:25 14.08.23	Name	
Smallest font on page	4.45 pt	Status	
		Template	Rect_1LT_ILang_NA_TR.indt





AGİL® EXTRA 100 EC



ADAMA

GRUP

A

HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

Emülsiyon Konsantr (EC)

100 g/l PROPAQUİZAFOP

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YAŞAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ. ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. İlacın yutulması halinde mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluması halinde; temiz havaya çıkarınız. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapınız. Derhal doktor çağırınız.

Yutulması halinde; kişinin bilinci açık ise ağzını iyice yıkayınız. Kusturmayınız. Derhal doktor çağırınız.

Ciltle teması halinde; Kirli tüm giysi ve ayakkabılarınızı çıkartınız. Hemen bol su sabunla yıkayınız. Gerekirse bir doktora danışınız.

Gözle teması halinde; Bkz. önlem ifadeleri P305+P351+P338 ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir anti dötü yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

İMAL TARİHİ: AMBALAJIN ÜZERİNDEDİR.
SON KULLANMA TARİHİ: AMBALAJIN ÜZERİNDEDİR.
SARJ NO: AMBALAJIN ÜZERİNDEDİR.
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 01/09/1996 ve 3001

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Uygulama Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Kanyas (Sorghum halepense)	100 ml/da	Çıkış sonrası, Kanyas 25-40 cm iken	90 gün
Patates	Kanyas (Sorghum halepense) Darıcan (Echinocloa crus-galli) Yapışkan ot (Setaria verticillata)	50 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde, Kanyas 20-40 cm iken	28 gün
*Bağ	Kanyas (Sorghum halepense)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyas 25-40 cm iken	-
Sekerpançarı	Kanyas (Sorghum halepense)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyas 25-40 cm iken	-
Karıya Mercimek	Kısa yabani yulaf (Avena sterilis) Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)	60 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	90 gün
Sağan	Yabani yulaf (Avena fatua) Kus yemi -Yumusak başaklı kuysemi (Phalaris paradoxa)	35 ml/da	Yabancı otların kardeşlenme devresinde	-
Ayçiçeği	Darıcan (Echinocloa crus-galli) Kanyas (Sorghum halepense) Yapışkan ot (Setaria verticillata)	50 ml/da	Çıkış sonrası Kanyas 25-40 cm iken	56 gün
Damates	Kanyas (Sorghum halepense) Darıcan (Echinocloa crus-galli)	100 ml/da 75 ml/da	Çıkış sonrası	56 gün 56 gün
Kanala	Kanyas (Sorghum halepense) Köpüksü ayrağı (Cynodon dactylon) Kus yemi -Yumusak başaklı kuysemi (Phalaris paradoxa) Yabani yulaf (Avena fatua) Tilkikuyruğu (Alopesurus myosuroides) Tavşanbıyığı =Salikim otu (Poa annua)	50 ml/da	Çıkış sonrası Yabancı otların kardeşlenme devresinde	56 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakiyken ilacı su depoya ilave edilir. Karıştırıya devam edilerek, doz suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekana kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yapraze huzezmi meme kullanılmadılır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmadılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgırlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: Uygulamadan tamamlanımsından hemen sonra ilaqlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalı. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

AGİL EXTRA 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. AGİL EXTRA 100 EC dar yapraklı yabancı otların yaygın olduğu alanlarda etkilidir. Uygulamadan önce bitki koruma ürününün etki mekanizmasını öğreniniz. AGİL EXTRA 100 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde kullanılabilir ancak dar yapraklı yabancı otlar uygulama anında çıkış emalidir. AGİL EXTRA 100 EC ilaqlaması sırasında yabancı otların aktif büyüme devresinde olmaları daha iyi etki almalarını sağlar. İlaqlamada iyi bir kaplama yapılması lazımdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgırlı hava koşullarında yapılmalıdır.

DİRENC İLE İLGİLİ BİLGİ:

AGİL EXTRA 100 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnc gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnc gelişimini geciktirmek için AGİL EXTRA 100 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulama tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A hariç) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışım gerektiriyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

İÇİNDEKİLER	Propaquizafop
-------------	---------------

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H304 Solunum yoluyla nefiuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H411 Suluç ortamında uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH046 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte sunuluğa ve cilt lekelerine neden olabilir.
EUH208 Propaquizafop içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
P201 Sorunucu kayıfett, öldürür, göz ve yüz koruyucu kullanınız.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile en az 15 dakika dikkatlice durulayınız. Takili ve yapması kolayca, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.
P331 Kusturmayınız.
P501 İzin verildiği kabi onaylanmış bir atık depolama alanına bertaraf ediniz.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Yeryatı ve yerüstü sularına bulandırmaktan kaçınıınız.
- Kullanıldıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.
- Boşolan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşolan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Kendi ambalajında ağzı kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılan bir yerde, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz. 35 °C'nin üzerinde depolamayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Bitki koruma ürününün kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerek tatbikat metodunun seçiminde, bitki koruma ürününün taşınmasında, depolanmasında, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak maimkindir. Bitki koruma ürününün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece teslim sırasında firma garantisine tabidir.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM

TESİSİ: Adama Agan Ltd. Northern Industrial Zone P.O. Box 262 Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. Cınarı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 3/0806 KonaK/İZMİR Tel: 0232 442 61 40



3082




8 681128 584010

UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF

12 x 1 L

Product name	AGİL® EXTRA 100 EC	
Country	TR	
Package size		
Label code		
Label dimensions (w x h)	300mm x 150mm	
Label date	14.08.25 14.08.23	Name
Smallest font on page	3,79 pt	Status
		Template

111952025FR_101

Product name	AGIL® EXTRA 100 EC		
Country	TR		
Package size			
Label code			
Label dimensions (w × h)	151mm × 125mm	Name	
Label date	14.08.25 14.08.23	Status	
Smallest font on page	<SmallestFont>	Template	Rect_ILT_ILong_NA_TR.indt