

Ruhsat tarih/No. : 02.11.2016 / 10777

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Buğday	Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Karaçayır (<i>Lolium perenne</i>) Yumuşak başaklı kuşyemi (<i>Phalaris paradoxa</i>) Kısır Yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	90 ml/da (Çıkış sonrası)


Özellikleri : Traxos 050 EC, buğday çeşitlerinde dar yapraklı yabancıotları kontrol eden ve Pinoxaden + clodinafop-propargyl aktif maddelerinin karışımından oluşan sistemik yeni bir herbisittir. Buğdayın erken kardeşlenme döneminden bayrak yaprağı çıkarma dönemine kadar geniş bir kullanım aralığı vardır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ : Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz , içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da ürün Güvenlik Bilgi Formu' nu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

İÇİNDEKİLER:

Clodinafop - propargyl

Pinoxaden

Cloquintocet mexyl

Solvent naphta

ZARARLILIK İŞARETLERİ



Uyarı Kelimesi : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Balıklara zehirlidir.

*Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.

*Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, üç kez su ile duruladıktan sonra usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :

Dekara 20 - 40 litre su kullanılmalıdır. Uygulama aletinin basıncının 3 bar olması önerilir. Yelpeze hüzmeli meme ile uygulama yapılmalıdır.

DİKKAT: **Traxos 050 EC, Yulafta kullanılmamalıdır.** Kuraklık, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi stresli koşullarda etki düşüklüğü bekleneneğinden bu koşulların varlığı durumunda uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Uygulama Zamanı : Buğdayın erken kardeşlenme devresinden bayrak yaprağı çıkarma devresine kadar çıkış sonrası olarak uygulanabilir.

Traxos 050 EC uygulamadan bir saat sonra yağın yağışlardan etkilenmez. 2,4-D gibi Hormon içerikli herbisitlerle karışımlarından kaçınılmalı, **Traxos 050 EC** önce uygulanmışsa hormon içerikli herbisitler yedi gün sonra; hormon içerikli herbisitler önce uygulanmışsa **Traxos 050 EC** 21 gün sonra uygulanmalıdır. Hububat ile rotasyona giren ürünlerde hiçbir fitotoksik etkisi yoktur. Biyolojik etkinlikte toprak tipi ve organik madde içeriğinin önemi yoktur.

Bitki tahammülü :

Önerildiği şekilde kullanıldığında **Traxos 050 EC**, tavsiye edildiği kültür bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir. Hiçbir fitotoksitesi yoktur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Traxos 050 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **Traxos 050 EC** Aynı üretim sezonunda önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğinde farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Traxos 050 EC, bitki koruma ürünlerinin bir çoğu ile uygulama zamanları doğru olmak kaydı ile tank karışımı şeklinde karıştırılabilir. Karışıma girecek bitki koruma ürünleri uygulama tankına ayrı ayrı ilave edilmeli, karıştırıcı sürekli çalıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır. Hormon içerikli herbisit karışımlarından kaçınılmalıdır.



Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A / A	Herbisit(Yabancı ot ilacı)
--------------	--------------	-----------------------------------

25 g/L Pinoxaden
25 g/L Clodinafop-propargyl
6.25 g /L Cloquintocet-mexyl (Safener)

Deri teması durumunda : Derhal bitki koruma ürününün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. Ürünün bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekliyse derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **3** yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı bitki koruma ürününün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67
4058 Basel , İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

CHEMARK ZRT 06/75 hrsz.,
H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep,
Macaristan

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mansuroğlu Mah.
Ankara Cad. No. 81
Bayraklı Tower Kat 17
Daire: 109-115
35030 Bayraklı –İZMİR
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

® Syngenta şirketler grubunun ticari tescilli mar kasıdır