



ADAMA

MAVRİK® 2F

MAVRİK® 2F



Şimdi MAVRİK® 2F
Zamanı!

ADAMA Kalitesiyle!

MAVRİK® 2F ADAMA'nın marka tescilli ticari ürünüdür.



İNSEKTİSİT

Dinle › Anla › Paylaş

ADAMA.COM/TURKEY

ÖZELLİKLERİ

- Zararlıya karşı ani etki gösterir.
- Birçok faydalıya karşı güvenlidir.
- Tavsiye edildiği ürünlerde fitotoksisite yapmaz, leke bırakmaz.
- Yıkılmaya dayanıklıdır, etkinliği uzun süre devam eder.
- Diğer sentetik piretroidlerden farklı olarak yüksek ve düşük sıcaklıklardan etkilenmez.

FAYDALARI

- Meyvede zararın önlenmesiyle kaliteli ürünün artmasına destek olur.
- Faydalı böcek popülasyonu korunur. Tozlaşma ve dölllenme olumsuz etkilenmez.
- Bitkinin her döneminde güvenle kullanılır. Bitkiye zarar vermez.
- Daha az ilaçlama sayısı ile zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.
- Uzun süre etkinliğini korur. Gelir artışı sağlar.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	30 ml/100 L su larva	14 gün
	Elma yeşil yaprakbiti (<i>Aphis pomi</i>)	10 ml/100 L su nimf ve ergin	
Kiraz	Elma yaprakbükünü (<i>Archips rosana</i>)	30 ml/100 L su ergin	14 gün
	Kiraz sineği (<i>Rhagoletis cerasi</i>)	30 ml/100 L su ergin	
Şeftali	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	10 ml/100 L su nimf ve ergin	14 gün
Antepfıstığı	Antepfıstığı psillidi (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	20 ml/100 L su nimf ve ergin	14 gün
Portakal*	Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens</i>)	30 ml/100 L su nimf ve ergin	7 gün
	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	3 ml + 200 ml Nu-lure**/10 L su ergin	
Mandalina*	Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens</i>)	30 ml/100 L su nimf ve ergin	7 gün
	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	3 ml + 200 ml Nu-lure**/10 L su ergin	
Limon*	Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens</i>)	30 ml/100 L su nimf ve ergin	7 gün
	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	3 ml + 200 ml Nu-lure**/10 L su ergin	
Greyfurt*	Yaprakpireleri (<i>Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens</i>)	30 ml/100 L su nimf ve ergin	7 gün
	Akdeniz meyvesineği (<i>Ceratitis capitata</i>)	3 ml + 200 ml Nu-lure**/10 L su ergin	
Bağ***	Bağ tripsleri (<i>Rubiothrips vitis, Mycerothrips albicornis, Mycerothrips tschirkunae, Thrips tabaci</i>)	30 ml/100 L su larva ve ergin	14 gün
Pamuk	Pamuk yaprakpireleri (<i>Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens</i>)	20 ml/da nimf ve ergin	14 gün
Domates (Sera-Tarla)	Şeftali yaprakbiti (<i>Myzus persicae</i>)	20 ml/da nimf ve ergin	3 gün
Badem	Badem içkurdu (<i>Eurytoma amygdali</i>)	40 ml/100 L su ergin	14 gün
Ceviz	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	30 ml/100 L su larva	14 gün
Erik****	Erik içkurdu (<i>Cydia funebrana</i>)	30 ml/100 L su larva	14 gün
Armut****	Armut psillidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	50 ml/100 L su nimf ve ergin	14 gün

* Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

** Nu-lure, %44 hidrolize edilmiş mısır glüten yemi.

*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**** Komisyon tarafından uygun bulunmuştur, onaylı etiketi beklenmektedir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Kazım Dirik Mah. Ankara Cad. 296 Sok. No:8 Folkart Time 1. Blok Kat:5 D: 515, 35100, Bornova /İZMİR
www.adama.com/turkey facebook.com/adamaturkiye @adama_turkiye



Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz. Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)'in 114 No'lu Telefonunu Arayınız.