

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 20.03.2023/ 12708

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ
Buğday	Süpürge otu (<i>Descurainia sophia</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Pekmez hardalı (<i>Erysimum repandum</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Gökbaş (<i>Centaurea depressa</i>) Tarla köpek papatyası (<i>Anthemis arvensis</i>)	200 ml/da (Çıkış öncesi)
	Kısır yabani yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	250 ml/da (Çıkış öncesi)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ADAMA

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FIRSTPOINT® 590 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	K1,3	C2,5	F1,12	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

300 g/l Pendimethalin + 250 g/l Chlorotoluron + 40 g/l Diflufenican

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

GENEL BİLGİLER: Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse kullanım talimatlarını veya güvenlik bilgi formunu gösterin). İlk yardımcı: kendilerinin korunmalarına dikkat!

SOLUMA: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapın. Bir doktor çağırın.

YUTMA: Ağız iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

ÇİLTLE TEMAS: Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın.

GÖZLERLE TEMAS: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL)

İÇİNDEKİLER	Pendimethalin, Chlorotoluron, Diflufenican
-------------	---



UYARI KELİMESİ: Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ

H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH208 1,2-Benzisothiazolin-3- on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P501 İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz, boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Uygulama amacı ile hazırlanan karışım bekletilmeden kullanılmalıdır.
- Boş gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

FIRSTPOINT® 590 SC köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımını durdurur. Böylece yabancı otların rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir.

- Uygulamalar günün serin saatlerinde ve rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
- Sıcak, soğuk, kurak, don ve aşırı yağıştan kaynaklanan stres koşullarında uygulama ertelenmelidir. Bu koşullardan etkilenmemiş, sağlıklı bitkilere uygulanmalıdır.
- Elverişsiz koşullarda mahsulün zarar görmesine ve verimin düşmesine neden olabileceğinden, uygulamanın üst üste gelmesinden kaçın.
- En iyi sonucu elde etmek için, iyi toprak hazırlığı yapılmış, yeterli neme sahip arazilere uygulanmalıdır. Kuru, çatlamış veya su basmış topraklara uygulanmamalıdır.

EKİM MÜNAVEBESİ:

Hasattan sonra herhangi bir kısıtlama yoktur. Ürünün bozulması durumunda, ilkbaharda bir sonraki mahsulü ekmeden önce toprak işleme yapılmalıdır. Ürünün bozulmasını takiben aynı sonbaharda sadece kışlık buğday yeniden ekilebilir. Peş peşe buğday ekilen arazilerde diflufenican içeren ürünler sürekli uygulandığında, toprakta diflufenican birikimi oluşacaktır. 15 cm'ye kadar toprak işleme ve toprağın iyice karıştırılmasıyla bile, arkasından ekilen soğan, pırasa, diğer allium bitkileri ve yonca ürünlerine zarar verme riski olabilir. Tedbir olarak arazilerini bu mahsullerin yetiştiricilerine kiralayan kullanıcılar, o araziye kiralamadan önceki yıllarda diflufenican içeren ürünleri kullanmamalıdır veya üretici bu konuda bilgilendirilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

FIRSTPOINT® 590 SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup K1,3 C2,5 ve F1,12 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **FIRSTPOINT® 590 SC**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1,3 C2,5 ve F1,12 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışıma ihtiyaç duyulması halinde bir ön karışım testi yapılması önerilir.

®ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin tescilli ticari markasıdır.



ADAMA

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

FIRSTPOINT® 590 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUP	K1,3	C2,5	F1,12	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
------	------	------	-------	--------------------------------

300 g/l Pendimethalin + 250 g/l Chlorotoluron + 40 g/l Diflufenican

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek uygulama metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

Adama Ağan Ltd.

P.O. Box 262, Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kazımdirik Mah. 296 Sk. No: 8İç Kapı No: 515

Bornova/İzmir

Tel: 0232 462 61 40